

Е.А. Севостьянов (Житомирский государственный университет им. И. Франко)

Є.О. Севостьянов (Житомирський державний університет ім. І. Франко)

Е.А. Sevost'yanov (Zhytomyr Ivan Franko State University)

О граничном продолжении отображений в терминах простых концов

Про продовження відображень на межу в термінах простих кінців

On boundary behavior of mappings in terms of prime ends

Изучается граничное поведение классов отображений, относящихся к изучению классов Соболева и Орлича–Соболева в евклидовом n -мерном пространстве. В терминах простых концов регулярных областей получены теоремы о непрерывном продолжении указанных классов на границу области. Более того, изучено глобальное поведение семейств указанных отображений, в частности, доказаны результаты о равностепенной непрерывности их семейств в замыкании области в терминах простых концов.

Вивчається межова поведінка класів відображень, стисло пов'язаних з класами Соболева і Орліча–Соболева в евклідовому n -вимірному просторі. В термінах простих кінців регулярних областей отримано теореми про неперервне продовження зазначених класів на межу області. Більше того, вивчено глобальну поведінку сімей вказаних відображень, зокрема, доведено результати про одностайну неперервність їх сімей в замиканні області в термінах простих кінців.

A boundary behavior of mappings, which are closely related with Sobolev and Orlicz–Sobolev classes in n -measured Euclidean space, is investigated. There are obtained theorems on continuous boundary extension of classes mentioned above. Moreover, a global behavior of the mappings mentioned above was studied. In particular, there is proved equicontinuity of the classes mentioned above in the closure of the domain in terms of prime ends.

1. Введение. Настоящая работа посвящена изучению отображений с ограниченным и конечным искажением, активно изучаемых в последнее время в ряде работ отечественных и зарубежных авторов, см., напр., [1], [2], [3]–[4], [5]–[6], [7], [8], [9], [10]–[12], [13], [14] и [15]. Отдельного внимания заслуживают работы, в которых изложены результаты, относящиеся к изучению классов Орлича–Соболева в окрестности границы заданной области в терминах простых концов (см. [16] и [17]). Здесь же упомянем публикации, в которых исследовано граничное поведение этих классов в случае локально связных границ (см., напр., [9], [18], [19], [20]).

Остановимся теперь на работе [16], где получены важные результаты о граничном поведении гомеоморфизмов, удовлетворяющих определённым геометрическим ограничениям и тесно связанных с классами Соболева и Орлича–Соболева. Здесь, в частности, показано, что один класс гомеоморфизмов может быть продолжен на границу непрерывным образом, при этом, непрерывность должна пониматься в терминах так называемых простых концов, поскольку речь идёт о границах областей с «плохими» свойствами.

Одной из основных целей настоящей работы является усиление результатов из упомянутой публикации [16]. Задача, которую мы ставим перед собой, состоит в том, чтобы изложить сформированную теорию граничного продолжения отображений в максимально законченном виде. Мы достигаем этой цели, распространяя указанные результаты на отображения с ветвлением и используя здесь в качестве априорных условий более общие ограничения на коэффициент искажения отображений. Точнее говоря, прибегая к ограничениям на рост так называемой дилатации порядка α , мы тем самым охватываем результаты работы [16], где схожие ограничения касаются лишь специально выбранного случая «дилатации порядка n ». Таким образом, улучшение утверждений, относящихся к работе [16], происходит как бы в двух независимых направлениях: с одной стороны, мы ослабляем топологические условия на отображения, допуская наличие ветвлений, с другой стороны, более общая интерпретация коэффициента искажения также позволяет значительно расширить рассмотренную в [16] ситуацию.

Отметим, что настоящая работа состоит как бы из двух частей, тесно связанных между собой по смыслу и содержанию, но несколько отличающихся по цели исследования. В первой части речь идёт преимущественно о вопросах граничного поведения отображений, где кроме классов Орлича–Соболева изучена возможность непрерывного граничного продолжения так называемых кольцевых Q -отображений и нижних Q -отображений (см. [9]). Эти отображения на данный момент являются главным инструментом исследования отображений с конечным искажением (см., напр., [1]–[17]). Изучение граничного поведения нижних Q -отображений приводит к основным результатам настоящей статьи в качестве следствий. Эта часть работы заключена в разделах 2–4. Вторая часть содержит результаты о глобальном поведении отображений в области, точнее, о нормальных и равностепенно-непрерывных семействах отображений в замы-

кании области (где замыкание также следует понимать в смысле простых концов). Для простоты и большей ясности изложения мы ограничиваемся здесь случаем гомеоморфизмов. К этой части работы относятся разделы 5 и 6. Очевидная связь обеих частей состоит в том, что глобальное поведение отображений может быть изучено лишь после того, как установлено их непрерывное продолжение на границу области.

Приведём теперь необходимые для изложения сведения. Следующие определения могут быть найдены в работе [16]. Пусть ω – открытое множество в $\mathbb{R}^k$, $k = 1, \dots, n-1$. Непрерывное отображение $\sigma : \omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется k -мерной поверхностью в $\mathbb{R}^n$. Поверхностью будет называться произвольная $(n-1)$ -мерная поверхность σ в $\mathbb{R}^n$. Поверхность $\sigma : \omega \rightarrow D$ называется жордановой поверхностью в D , если $\sigma(z_1) \neq \sigma(z_2)$ при $z_1 \neq z_2$. Далее мы иногда будем использовать σ для обозначения всего образа $\sigma(\omega) \subset \mathbb{R}^n$ при отображении σ , $\bar{\sigma}$ вместо $\overline{\sigma(\omega)}$ в $\mathbb{R}^n$ и $\partial\sigma$ вместо $\overline{\sigma(\omega)} \setminus \sigma(\omega)$. Жорданова поверхность σ в D называется разрезом области D , если σ разделяет D , т. е. $D \setminus \sigma$ имеет больше одной компоненты, $\partial\sigma \cap D = \emptyset$ и $\partial\sigma \cap \partial D \neq \emptyset$.

Последовательность $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m, \dots$ разрезов области D называется цепью, если:

- (i) $\bar{\sigma}_i \cap \bar{\sigma}_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots$;
- (ii) σ_{m-1} и σ_{m+1} содержатся в различных компонентах $D \setminus \sigma_m$ для всех $m > 1$;
- (iii) $\cap d_m = \emptyset$, где d_m – компонента $D \setminus \sigma_m$, содержащая σ_{m+1} .

Согласно определению, цепь разрезов $\{\sigma_m\}$ определяет цепь областей $d_m \subset D$, таких, что $\partial d_m \cap D \subset \sigma_m$ и $d_1 \supset d_2 \supset \dots \supset d_m \supset \dots$. Две цепи разрезов $\{\sigma_m\}$ и $\{\sigma'_k\}$ называются эквивалентными, если для каждого $m = 1, 2, \dots$ область d_m содержит все области d'_k за исключением конечного числа и для каждого $k = 1, 2, \dots$ область d'_k также содержит все области d_m за исключением конечного числа. Конец области D – это класс эквивалентных цепей разрезов D .

Пусть K – конец области D в $\mathbb{R}^n$, $\{\sigma_m\}$ и $\{\sigma'_m\}$ – две цепи в K , d_m и d'_m – области, соответствующие σ_m и σ'_m . Тогда

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} \bar{d}_m \subset \bigcap_{m=1}^{\infty} \bar{d}'_m \subset \bigcap_{m=1}^{\infty} \bar{d}_m,$$

и, таким образом,

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} \bar{d}_m = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bar{d}'_m,$$

т. е. множество

$$I(K) = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bar{d}_m$$

зависит только от K и не зависит от выбора цепи разрезов $\{\sigma_m\}$. Множество $I(K)$ называется телом конца K .

Число прообразов $N(y, S) = \text{card } S^{-1}(y) = \text{card } \{x \in \omega : S(x) = y\}$, $y \in \mathbb{R}^n$ будем называть функцией кратности поверхности S . Другими словами, $N(y, S)$ – кратность накрытия точки y поверхностью S . Пусть $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ – борелевская функция,

в таком случае интеграл от функции ρ по поверхности S определяется равенством: $\int_S \rho d\mathcal{A} := \int_{\mathbb{R}^n} \rho(y) N(y, S) d\mathcal{H}^k y$. Пусть Γ – семейство k -мерных поверхностей S . Боре-левскую функцию $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}^+}$ будем называть *допустимой* для семейства Γ , сокр. $\rho \in \text{adm } \Gamma$, если

$$\int_S \rho^k d\mathcal{A} \geq 1 \quad (1)$$

для каждой поверхности $S \in \Gamma$. Пусть $p \geq 1$, тогда p -модулем семейства Γ назовём величину

$$M_p(\Gamma) = \inf_{\rho \in \text{adm } \Gamma} \int_{\mathbb{R}^n} \rho^p(x) dm(x).$$

Полагаем также $M(\Gamma) := M_n(\Gamma)$. Далее, как обычно, для множеств A , B и C в $\mathbb{R}^n$, $\Gamma(A, B, C)$ обозначает семейство всех кривых, соединяющих A и B в C .

Следуя [21], будем говорить, что конец K является *простым концом*, если K содержит цепь разрезов $\{\sigma_m\}$, такую, что

$$M(\Gamma(C, \sigma_m, D)) = 0$$

для некоторого континуума C в D , где M – модуль семейства $\Gamma(C, \sigma_m, D)$.

Будем говорить, что граница области D в $\mathbb{R}^n$ является *локально квазиконформной*, если каждая точка $x_0 \in \partial D$ имеет окрестность U , которая может быть отображена квазиконформным отображением φ на единичный шар $\mathbb{B}^n \subset \mathbb{R}^n$ так, что $\varphi(\partial D \cap U)$ является пересечением $\mathbb{B}^n$ с координатной гиперплоскостью. Говорим, что ограниченная область D в $\mathbb{R}^n$ *регулярна*, если D может быть квазиконформно отображена на область с локально квазиконформной границей.

Как следует из теоремы 4.1 в [21], при квазиконформных отображениях g области D_0 с локально квазиконформной границей на область D в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, существует естественное взаимно однозначное соответствие между точками ∂D_0 и простыми концами области D и, кроме того, предельные множества $C(g, b)$, $b \in \partial D_0$, совпадают с телом $I(P)$ соответствующих простых концов P в D .

Если $\overline{D}_P$ является пополнением регулярной области D ее простыми концами и g_0 является квазиконформным отображением области D_0 с локально квазиконформной границей на D , то оно естественным образом определяет в $\overline{D}_P$ метрику $\rho_0(p_1, p_2) = |\tilde{g}_0^{-1}(p_1) - \tilde{g}_0^{-1}(p_2)|$, где $\tilde{g}_0$ продолжение g_0 в $\overline{D}_0$, упомянутое выше.

Если g_* является другим квазиконформным отображением некоторой области D_* с локально квазиконформной границей на область D , то соответствующая метрика $\rho_*(p_1, p_2) = |\tilde{g}_*^{-1}(p_1) - \tilde{g}_*^{-1}(p_2)|$ порождает ту же самую сходимост и, следовательно, ту же самую топологию в $\overline{D}_P$ как и метрика ρ_0 , поскольку $g_0 \circ g_*^{-1}$ является квазиконформным отображением между областями D_* и D_0 , которое по теореме 4.1 из [21] продолжается до гомеоморфизма между $\overline{D}_*$ и $\overline{D}_0$.

В дальнейшем, будем называть данную топологию в пространстве $\overline{D}_P$ *топологией простых концов* и понимать непрерывность отображений $F : \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$ как раз относительно этой топологии.

Пусть $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ – неубывающая функция, f – локально интегрируемая вектор-функция n вещественных переменных $x_1, \dots, x_n$, $f = (f_1, \dots, f_n)$, $f_i \in W_{loc}^{1,1}$, $i = 1, \dots, n$. Будем говорить, что $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $W_{loc}^{1,\varphi}$, пишем $f \in W_{loc}^{1,\varphi}$, если $\int_G \varphi(|\nabla f(x)|) dm(x) < \infty$ для любой компактной подобласти $G \subset D$, где $|\nabla f(x)| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)^2}$. Класс $W_{loc}^{1,\varphi}$ называется классом *Орлица–Соболева*. Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *дискретным*, если прообраз $f^{-1}(y)$ каждой точки $y \in \mathbb{R}^n$ состоит только из изолированных точек. Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *открытым*, если образ любого открытого множества $U \subset D$ является открытым множеством в $\mathbb{R}^n$. Отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *сохраняющим границу отображением* (см. [22, разд. 3, гл. II]), если выполнено соотношение $C(f, \partial D) \subset \partial f(D)$. Отметим, что условие сохранения границы для открытых дискретных отображений эквивалентно тому, что отображение f *замкнуто* (т.е., $f(A)$ замкнуто в $f(D)$ для любого замкнутого $A \subset D$), а также тому, что $f^{-1}(K)$ компактно в D для любого компакта $K \subset f(D)$ (см. [22, теорема 3.3]).

Будем говорить, что граница ∂D области D *сильно достижима в точке* $x_0 \in \partial D$ *относительно p -модуля*, если для любой окрестности U точки x_0 найдется компакт $E \subset D$, окрестность $V \subset U$ точки x_0 и число $\delta > 0$ такие, что

$$M_p(\Gamma(E, F, D)) \geq \delta$$

для любого континуума F в D , пересекающего ∂U и ∂V . (Здесь M_p обозначает модуль семейств кривых, а $\Gamma(E, F, D)$ обозначает семейство всех кривых, соединяющих множества E и F в области D , см., напр., [9, разделы 2.2 и 2.5]). Граница области $D \subset \mathbb{R}^n$ называется *сильно достижимой относительно p -модуля*, если указанное выше свойство выполнено в каждой точке $x_0 \in \partial D$.

Для отображений класса $W_{loc}^{1,1}$, произвольного $p \geq 1$ и почти всех $x \in D$ определим следующие величины: $l(f'(x)) := \min_{|h|=1} |f'(x)h|$, $J(x, f) := \det f'(x)$,

$$K_{I,p}(x, f) = \begin{cases} \frac{|J(x, f)|}{l(f'(x))^p}, & J(x, f) \neq 0, \\ 1, & f'(x) = 0, \\ \infty, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \quad (2)$$

Величина $K_{I,p}(x, f)$ называется *внутренней дилатацией отображения f порядка p в точке x* . Всюду ниже мы полагаем $K_I(x, f) := K_{I,n}(x, f)$. Будем говорить, что локально интегрируемая функция $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$ имеет *конечное среднее колебание* в точке $x_0 \in D$,

пишем $\varphi \in FMO(x_0)$, если

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\Omega_n \varepsilon^n} \int_{B(x_0, \varepsilon)} |\varphi(x) - \bar{\varphi}_\varepsilon| dm(x) < \infty,$$

где $\bar{\varphi}_\varepsilon = \frac{1}{\Omega_n \varepsilon^n} \int_{B(x_0, \varepsilon)} \varphi(x) dm(x)$. Заметим, что $\Omega_n \varepsilon^n = m(B(x_0, \varepsilon))$. Основным результа-

том настоящей статьи, относящимся к непрерывному продолжению классов Орлича–Соболева на границу, является следующая теорема.

Всюду в статье, если не оговорено противное, $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ – измеримая по Лебегу функция, равная нулю вне заданной области D , при этом, мы требуем, чтобы $0 < Q(x) < \infty$ при всех $x \in D$.

Теорема 1. Пусть $n \geq 2$, $\alpha > 1$, область $D \subset \mathbb{R}^n$ регулярна, а $D' \subset \mathbb{R}^n$ ограничена и имеет локально квазиконформную границу, являющуюся сильно достижимой относительно α -модуля. Пусть также отображение $f : D \rightarrow D'$, $D' = f(D)$, принадлежащее классу $W_{loc}^{1, \varphi}(D)$ является открытым, дискретным и замкнутым. Тогда f имеет непрерывное продолжение до непрерывного отображения $f : \bar{D}_P \rightarrow \bar{D}'_P$, $f(\bar{D}_P) = \bar{D}'_P$, если выполнено условие

$$\int_1^\infty \left(\frac{t}{\varphi(t)} \right)^{\frac{1}{n-2}} dt < \infty \quad (3)$$

и, кроме того, найдётся измеримая по Лебегу функция Q , такая что $K_{I, \alpha}(x, f) \leq Q(x)$ при почти всех $x \in D$, и выполнено одно из следующих условий:

1) либо в каждой точке $x_0 \in \partial D$ при некотором $\varepsilon_0 > 0$ и всех $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ выполнены следующие условия:

$$\int_\varepsilon^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} = \infty;$$

2) либо $Q \in FMO(x_0)$ в каждой точке $x_0 \in \partial D$. Здесь

$$q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$$

обозначает среднее интегральное значение функции Q над сферой $S(x_0, r)$. В частности, заключение теоремы 1 является верным, если $q_{x_0}(r) = O\left(\left(\log \frac{1}{r}\right)^{n-1}\right)$ при $r \rightarrow 0$.

Приведём по этому поводу ещё один важный результат, аналог которого был получен для гомеоморфизмов на плоскости в [17, лемма 5.1 и теорема 5.1] (насколько нам известно, пространственный случай как гомеоморфизмов, так и отображений с ветвлением, нигде ранее не публиковался).

Теорема 2. Пусть $n \geq 2$, $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$, $Q(x) \equiv 0$ на $\mathbb{R}^n \setminus D$, $p \geq 1$, область $D \subset \mathbb{R}^n$ регулярна, а $D' \subset \mathbb{R}^n$ ограничена и имеет локально квазиконформную границу,

являющуюся сильно достижимой относительно p -модуля. Пусть также отображение $f : D \rightarrow D'$, $D' = f(D)$, является кольцевым Q -отображением относительно p -модуля в каждой точке $x_0 \in \partial D$, кроме того, f является открытым, дискретным и замкнутым. Тогда f продолжается до непрерывного отображения $f : \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$, $f(\overline{D}_P) = \overline{D}'_P$, если выполнено одно из следующих условий:

1) либо в каждой точке $x_0 \in \partial D$ при некотором $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(x_0) > 0$ и всех $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{p-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{p-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(t)} = \infty, \quad (4)$$

где $q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$;

2) либо $Q \in FMO(x_0)$ в каждой точке $x_0 \in \partial D$.

Сформулируем теперь наиболее важные результаты, относящиеся ко второй части настоящей работы. Для этой цели напомним некоторые определения. Пусть (X, d) и (X', d') — метрические пространства с расстояниями d и d' , соответственно. Семейство $\mathfrak{F}$ отображений $f : X \rightarrow X'$ называется *равностепенно непрерывным* в точке $x_0 \in X$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое, что $d'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ для всех $f \in \mathfrak{F}$ и для всех $x \in X$ таких, что $d(x, x_0) < \delta$. Говорят, что $\mathfrak{F}$ *равностепенно непрерывно*, если $\mathfrak{F}$ равностепенно непрерывно в каждой точке из $x_0 \in X$. Всюду далее, если не оговорено противное, d — одна из метрик в пространстве простых концов относительно области D , упомянутых выше, а d' — евклидова метрика.

Для числа α , такого что $\alpha > 1$, областей $D, D' \subset \mathbb{R}^n$, $z_1, z_2 \in D$, $z_1 \neq z_2$, $z'_1, z'_2 \in D'$ и произвольной измеримой по Лебегу функции $Q(x)$ обозначим символом $\mathfrak{F}_{\varphi, Q, \alpha}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ семейство всех гомеоморфизмов $f : D \rightarrow D'$ класса $W_{loc}^{1, \varphi}$ в D , $f(D) = D'$, таких что $K_{I, \alpha}(x, f) \leq Q(x)$ и

$$f(z_1) = z'_1, \quad f(z_2) = z'_2.$$

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 3. Пусть $n \geq 2$, $\alpha > 1$, область $D \subset \mathbb{R}^n$ регулярна, а область $D' \subset \mathbb{R}^n$ имеет локально квазиконформную границу, которая является сильно достижимой относительно α -модуля. Предположим, $Q \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, что заданная неубывающая функция $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ удовлетворяет условию (3), и что для каждого $x_0 \in \overline{D}$ выполнено одно из следующих условий:

1) либо $Q \in FMO(\overline{D})$;

2) либо в каждой точке $x_0 \in \overline{D}$ при некотором $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(x_0) > 0$ и всех $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{n-\alpha}} q_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{n-\alpha}} q_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} = \infty,$$

где $q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$.

Тогда каждый элемент $f \in \mathfrak{F}_{\varphi, Q, \alpha}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ продолжается до непрерывного отображения $\bar{f}: \bar{D}_P \rightarrow \bar{D}'_P$, при этом, семейство отображений $\mathfrak{F}_{\varphi, Q, \alpha}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(\bar{D}_P, \bar{D}'_P)$, состоящее из всех продолженных таким образом отображений, является равностепенно непрерывным, а значит, и нормальным в $\bar{D}_P$.

Ещё один вариант теоремы о нормальных семействах отображений относится к ситуации, когда фиксируется одна, а не две точки заданной области. По этому поводу напомним ещё одно важное определение. Согласно [23], область D в $\mathbb{R}^n$ будем называть *областью квазиэкстремальной длины*, сокр. *QED-областью*, если

$$M(\Gamma(E, F, \mathbb{R}^n)) \leq A \cdot M(\Gamma(E, F, D)) \quad (5)$$

для конечного числа $A \geq 1$ и всех континуумов E и F в D . Для областей $D, D' \subset \mathbb{R}^n$, $b_0 \in D$, $b'_0 \in D'$ и произвольной измеримой по Лебегу функции Q обозначим символом $\mathfrak{F}_{b_0, b'_0, \varphi, Q}(D, D')$ семейство всех гомеоморфизмов $f: D \rightarrow D'$ класса $W_{loc}^{1, \varphi}$ в D , $f(D) = D'$, таких что $K_I(x, f) \leq Q(x)$ и $f(b_0) = b'_0$. Справедливо следующее утверждение.

Теорема 4. Пусть область D регулярна, область D' ограничена, имеет локально квазиконформную границу и, одновременно, является QED-областью. Предположим, $Q \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$, заданная неубывающая функция $\varphi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ удовлетворяет условию (3), и что для каждого $x_0 \in \bar{D}$ выполнено одно из следующих условий:

- 1) либо $Q \in FMO(\bar{D})$;
- 2) либо в каждой точке $x_0 \in \bar{D}$ при некотором $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(x_0) > 0$

$$\int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t q_{x_0}^{\frac{1}{n-1}}(t)} = \infty,$$

где $q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$.

Тогда каждый элемент $f \in \mathfrak{F}_{b_0, b'_0, \varphi, Q}(D, D')$ продолжается до непрерывного отображения $\bar{f}: \bar{D}_P \rightarrow \bar{D}'_P$, при этом, семейство отображений $\mathfrak{F}_{b_0, b'_0, \varphi, Q}(\bar{D}_P, \bar{D}'_P)$, состоящее из всех продолженных таким образом отображений, является равностепенно непрерывным, а значит, и нормальным в $\bar{D}_P$.

2. Вспомогательные сведения. Дальнейшее изложение и доказательство теоремы 1 существенно опираются на аппарат так называемых нижних Q -гомеоморфизмов (см. [9, глава 9]). Говорят, что некоторое свойство P выполнено для p -почти всех поверхностей области D , если оно имеет место для всех поверхностей, лежащих в D , кроме, быть может, некоторого их подсемейства, p -модуль которого равен нулю. Будем говорить, что измеримая по Лебегу функция $\rho: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ *обобщённо допустима относительно p -модуля* для семейства Γ k -мерных поверхностей S в $\mathbb{R}^n$, сокр. $\rho \in \text{ext}_p \text{ adm } \Gamma$, если соотношение (1) выполнено для p -почти всех поверхностей S семейства Γ . Следующий класс отображений представляет собой обобщение квазиконформных отображений в смысле кольцевого определения по Герингу ([24]) и отдельно исследуется (см.,

напр., [9, глава 9]). Пусть D и D' – заданные области в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $x_0 \in \overline{D} \setminus \{\infty\}$ и $Q : D \rightarrow (0, \infty)$ – измеримая по Лебегу функция. Будем говорить, что $f : D \rightarrow D'$ – *нижнее Q -отображение в точке x_0 относительно p -модуля*, как только

$$M_p(f(\Sigma_\varepsilon)) \geq \inf_{\rho \in \text{ext}_p \text{ adm } \Sigma_\varepsilon} \int_{D \cap A(x_0, \varepsilon, r_0)} \frac{\rho^p(x)}{Q(x)} dm(x) \quad (6)$$

для каждого кольца $A(x_0, \varepsilon, r_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \varepsilon < |x - x_0| < r_0\}$, $r_0 \in (0, d_0)$, $d_0 = \sup_{x \in D} |x - x_0|$, где Σ_ε обозначает семейство всех пересечений сфер $S(x_0, r)$ с областью D , $r \in (\varepsilon, r_0)$. Если $p = n$, то будем говорить, что f – *нижнее Q -отображение в точке x_0* . Будем говорить, что f – *нижнее Q -отображение относительно p -модуля в $A \subset \overline{D}$* , если соотношение (6) имеет место для каждого $x_0 \in A$.

Имеет место следующее утверждение, которое может быть доказано аналогично теореме 9.2 в [9], и потому опускается.

Лемма 1. Пусть $D, D' \subset \overline{\mathbb{R}^n}$, $x_0 \in \overline{D} \setminus \{\infty\}$ и Q – измеримая по Лебегу функция. Отображение $f : D \rightarrow D'$ является нижним Q -отображением относительно p -модуля в точке x_0 , $p > n - 1$, тогда и только тогда, когда $M_p(f(\Sigma_\varepsilon)) \geq \int_\varepsilon^{r_0} \frac{dr}{\|Q\|_s(r)} \quad \forall \varepsilon \in (0, r_0)$, $r_0 \in (0, d_0)$, $d_0 = \sup_{x \in D} |x - x_0|$, $s = \frac{n-1}{p-n+1}$, где, как и выше, Σ_ε обозначает семейство всех

пересечений сфер $S(x_0, r)$ с областью D , $r \in (\varepsilon, r_0)$, $\|Q\|_s(r) = \left(\int_{D(x_0, r)} Q^s(x) d\mathcal{A} \right)^{\frac{1}{s}}$ – L_s -норма функции Q над сферой $D(x_0, r) = \{x \in D : |x - x_0| = r\} = D \cap S(x_0, r)$.

Следующие важные сведения, касающиеся ёмкости пары множеств относительно области, могут быть найдены в работе В. Цимера [25]. Пусть G – ограниченная область в $\mathbb{R}^n$ и C_0, C_1 – непересекающиеся компактные множества, лежащие в замыкании G . Полагаем $R = G \setminus (C_0 \cup C_1)$ и $R^* = R \cup C_0 \cup C_1$, тогда p -ёмкостью пары C_0, C_1 относительно замыкания G называется величина $C_p[G, C_0, C_1] = \inf_R \int |\nabla u|^p dm(x)$, где точная нижняя грань берётся по всем функциям u , непрерывным в R^* , $u \in ACL(R)$, таким что $u = 1$ на C_1 и $u = 0$ на C_0 . Указанные функции будем называть *допустимыми* для величины $C_p[G, C_0, C_1]$. Мы будем говорить, что *множество $\sigma \subset \mathbb{R}^n$ разделяет C_0 и C_1 в R^** , если $\sigma \cap R$ замкнуто в R и найдутся непересекающиеся множества A и B , являющиеся открытыми в $R^* \setminus \sigma$, такие что $R^* \setminus \sigma = A \cup B$, $C_0 \subset A$ и $C_1 \subset B$. Пусть Σ обозначает класс всех множеств, разделяющих C_0 и C_1 в R^* . Для числа $p' = p/(p-1)$ определим величину

$$\widetilde{M}_{p'}(\Sigma) = \inf_{\rho \in \text{adm } \Sigma} \int_{\mathbb{R}^n} \rho^{p'} dm(x),$$

где запись $\rho \in \widetilde{\text{adm}} \Sigma$ означает, что ρ – неотрицательная борелевская функция в $\mathbb{R}^n$ такая, что

$$\int_{\sigma \cap R} \rho d\mathcal{H}^{n-1} \geq 1 \quad \forall \sigma \in \Sigma. \quad (7)$$

Заметим, что согласно результату Цимера

$$\widetilde{M}_p(\Sigma) = C_p[G, C_0, C_1]^{-1/(p-1)}, \quad (8)$$

см. [25, теорема 3.13] при $p = n$ и [26, с. 50] при $1 < p < \infty$. Заметим также, что согласно результату Хессе

$$M_p(\Gamma(E, F, D)) = C_p[D, E, F], \quad (9)$$

см. [?, теорема 5.5].

Для отображения $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, множества $E \subset D$ и $y \in \mathbb{R}^n$, определим *функцию кратности* $N(y, f, E)$ как число прообразов точки y во множестве E , т.е.

$$N(y, f, E) = \text{card} \{x \in E : f(x) = y\}, \quad N(f, E) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} N(y, f, E). \quad (10)$$

Пусть I – открытый, полуоткрытый или замкнутый интервал в $\mathbb{R}$. *Носителем* кривой $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется множество

$$|\alpha| := \{x \in \mathbb{R}^n : \exists t \in I : \alpha(t) = x\}.$$

Иногда, если недоразумение невозможно, кривая α и её носитель $|\alpha|$ отождествляются. Имеет место следующее утверждение, см., напр., [22, лемма 3.7].

Предложение 1. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ – открытое дискретное и замкнутое отображение, $\beta : [a, b] \rightarrow f(D)$ – произвольная кривая и $l = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} N(y, f, D)$. Тогда найдутся кривые $\alpha_j : [a, b] \rightarrow D$, $1 \leq j \leq l$, со следующим свойством:

- (1) $f \circ \alpha_j = \beta$, (2) $\text{card} \{j : \alpha_j(t) = x\} = |i(x, f)|$ для всех $x \in f^{-1}(|\beta|)$ и всех $t \in [a, b]$ (где $i(x, f)$ – локальный топологический индекс отображения f в точке x), и
(3) $\bigcup_{j=1}^l |\alpha_j| = f^{-1}(|\beta|)$.

Говорят, что семейство кривых Γ_1 *минорируется* семейством Γ_2 , пишем $\Gamma_1 > \Gamma_2$, если для каждой кривой $\gamma \in \Gamma_1$ существует подкривая, которая принадлежит семейству Γ_2 . В этом случае,

$$\Gamma_1 > \Gamma_2 \quad \Rightarrow \quad M_p(\Gamma_1) \leq M_p(\Gamma_2) \quad (11)$$

(см. [28, теорема 6.4, гл. I]).

3. О продолжении нижних Q -отображений на границу. В дальнейшем нам понадобится следующее вспомогательное утверждение (см., напр., [9, лемма 7.4, гл. 7] и [33, лемма 2.2] при $p \neq n$).

Предложение 2. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $Q(x)$ – измеримая по Лебегу функция, $Q \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$. Полагаем $A := A(r_1, r_2, x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : r_1 < |x - x_0| < r_2\}$ и $\eta_0(r) = \frac{1}{I r^{\frac{n-1}{p-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(r)}$,

где $I := I = I(x_0, r_1, r_2) = \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^{\frac{n-1}{p-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(r)}$ и $q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$ – среднее

интегральное значение функции Q над сферой $S(x_0, r)$. Тогда

$$\frac{\omega_{n-1}}{I^{p-1}} = \int_A Q(x) \cdot \eta_0^p(|x - x_0|) dm(x) \leq \int_A Q(x) \cdot \eta^p(|x - x_0|) dm(x)$$

для любой измеримой по Лебегу функции $\eta : (r_1, r_2) \rightarrow [0, \infty]$ такой, что $\int_{r_1}^{r_2} \eta(r) dr = 1$.

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 5. Пусть $n \geq 2$, $p > n - 1$, область $D \subset \mathbb{R}^n$ регулярна, а $D' \subset \mathbb{R}^n$ ограничена и имеет локально квазиконформную границу, являющуюся сильно достижимой относительно α -модуля, $\alpha := \frac{p}{p-n+1}$. Пусть также отображение $f : D \rightarrow D'$, $D' = f(D)$, является нижним Q -отображением в каждой точке $x_0 \in \partial D$ относительно p -модуля, кроме того, f является открытым, дискретным и замкнутым. Тогда f продолжается до непрерывного отображения $f : \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$, $f(\overline{D}_P) = \overline{D}'_P$, если выполнено одно из следующих условий:

1) либо в каждой точке $x_0 \in \partial D$ при некотором $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(x_0) > 0$ и всех $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ выполнены следующие условия:

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} = \infty, \quad (12)$$

где $\alpha = \frac{p}{p-n+1}$, $\tilde{q}_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q^{\frac{n-1}{p-n+1}}(x) d\mathcal{H}^{n-1}$ обозначает среднее интегральное

значение функции $Q^{\frac{n-1}{p-n+1}}(x)$ над сферой $S(x_0, r)$;

2) либо $Q^{\frac{n-1}{p-n+1}} \in FMO(\partial D)$.

Доказательство. Докажем вначале, что f имеет непрерывное продолжение $f : \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$. Рассмотрим прежде всего случай 1), т.е., когда имеют место соотношения (12). Так как D' имеет локально квазиконформную границу, то $\overline{D}'_P = \overline{D}'$ (см. [21, теорема 4.1]). В силу метризуемости пространства $\overline{D}_P$ достаточно доказать, что для каждого простого конца P области D предельное множество

$$L = C(f, P) := \left\{ y \in \mathbb{R}^n : y = \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_m), x_m \rightarrow P, x_m \in D \right\}$$

состоит из единственной точки $y_0 \in \partial D'$. (Здесь мы говорим, что последовательность точек $x_m \in D$, $m = 1, 2, \dots$, сходится к концу K , пишем $x_m \rightarrow P$ при $m \rightarrow \infty$, если для каждой цепи $\{\sigma_m\}$ в K и каждой области d_m все точки x_m , за исключением, быть может, конечного числа, принадлежат d_m , см., напр., [16, § 3]).

Заметим, что $L \neq \emptyset$ в силу компактности множества $\overline{D}'$, и L является подмножеством $\partial D'$ ввиду замкнутости отображения f (см. [22, теорема 3.3]). Предположим, что существуют, по крайней мере, две точки y_0 и $z_0 \in L$. Положим $U = B(y_0, r_0)$, где $0 < r_0 < |y_0 - z_0|$.

В силу [16, лемма 2] каждый простой конец P регулярной области D в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, содержит цепь разрезов σ_m , лежащую на сферах S_m с центром в некоторой точке $x_0 \in \partial D$

и евклидовыми радиусами $r_m \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$. Пусть D_m – области, ассоциированные с разрезами σ_m , $m = 1, 2, \dots$. Тогда существуют точки y_m и z_m в областях $D'_m = f(D_m)$, такие что $|y_0 - y_m| < r_0$ и $|y_0 - z_m| > r_0$ и, кроме того, $y_m \rightarrow y_0$ и $z_m \rightarrow z_0$ при $m \rightarrow \infty$. Соответственно, найдутся x_m и x'_m в области D_m , такие что $f(x_m) = y_m$ и $f(x'_m) = z_m$. Соединим точки x_m и y_m кривой γ_m , целиком лежащей в области D_m . Пусть C_m – образ этой кривой при отображении f в D' . Заметим, что $\partial U \cap |C_m| \neq \emptyset$ ввиду [29, теорема 1.I.5, § 46] (как обычно, $|C_m|$ обозначает носитель кривой C_m).

В силу определения сильно достижимой границы относительно α -модуля существует компакт $E \subset D'$ и число $\delta > 0$, такие, что

$$M_\alpha(\Gamma(E, |C_m|, D')) \geq \delta \quad (13)$$

для всех достаточно больших m .

Без ограничения общности можем считать, что последнее условие выполнено для всех $m = 1, 2, \dots$. Заметим, что $C = f^{-1}(E)$ является компактным подмножеством области D ввиду замкнутости отображения f (см. [22, теорема 3.3]), поэтому, поскольку $I(P) = \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{D_m} \subset \partial D$ (см. [16, предложение 1]), то не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что $C \cap \overline{D_m} = \emptyset$ для каждого $m \in \mathbb{N}$. Положим $\delta_0 := \text{dist}(x_0, C)$. Не ограничивая общности, уменьшая ε_0 , если это необходимо, можно считать, что $\varepsilon_0 < \delta_0$.

Пусть Γ_m – семейство всех кривых в D , соединяющих C и σ_m , $m = 1, 2, \dots$. Заметим, что $\Gamma(|\gamma_m|, C, D) > \Gamma_m$ ввиду [29, теорема 1.I.5, § 46], так что $f(\Gamma(|\gamma_m|, C, D)) > f(\Gamma_m)$ и ввиду (11)

$$M_\alpha(f(\Gamma(|\gamma_m|, C, D))) \leq M_\alpha(f(\Gamma_m)). \quad (14)$$

Оценим $M_\alpha(f(\Gamma(|\gamma_m|, C, D)))$ в формуле (14) снизу. Пусть кривая $\beta : [0, 1] \rightarrow D'$ такова, что $\beta(0) \in |C_m|$ и $\beta(t) \rightarrow p \in E$ при $t \rightarrow 1-0$, где p – некоторый фиксированный элемент множества E . Тогда для кривой β ввиду предложения 1 найдётся другая кривая $\gamma : [0, 1] \rightarrow D$ с началом в $|\gamma_m|$, такая, что $f \circ \gamma = \beta$. Поскольку f – замкнутое отображение, то оно сохраняет границу (см. [22, теорема 3.3]) и, значит, кривая γ лежит в D вместе со своим замыканием. Более того, в силу дискретности отображения f кривая γ может быть продолжена до кривой $\bar{\gamma} : [0, 1] \rightarrow D$. Заметим, что по определению $\beta(1) \in E$, так что $\bar{\gamma}(1) \in C$ по определению множества C . Значит, $\bar{\gamma} \in \Gamma(|\gamma_m|, C, D)$. Рассмотрим семейство Γ_m^* , состоящее из всех возможных таких кривых $\bar{\gamma}$, тогда $\Gamma_m^* \subset \Gamma(|\gamma_m|, C, D)$ и, одновременно, $f(\Gamma_m^*) = \Gamma(E, |C_m|, D')$. Тогда

$$M_\alpha(\Gamma(E, |C_m|, D')) = M_\alpha(f(\Gamma_m^*)) \leq M_\alpha(f(\Gamma(|\gamma_m|, C, D))). \quad (15)$$

Из (13), (14) и (15) вытекает, что

$$M_\alpha(f(\Gamma_m)) \geq \delta \quad (16)$$

для всех $m = 1, 2, \dots$. Заметим, что $f(\Gamma_m) \subset \Gamma(f(\sigma_m), E, D')$, поэтому из (16) вытекает, что

$$M_\alpha(\Gamma(f(\sigma_m), E, D')) \geq \delta \quad \forall \quad m = 1, 2, \dots \quad (17)$$

Оценим теперь величину $M_\alpha(\Gamma(f(\sigma_m), E, D'))$ сверху. Для этого подберём подходящим для нас способом систему разделяющих множеств для E и $f(\sigma_m)$ и воспользуемся определением нижнего Q -отображения.

Заметим, прежде всего, что множества E и $\overline{f(B(x_0, r) \cap D)}$ не пересекаются при любом $r \in (0, \varepsilon_0)$. Предположим противное, а именно, что найдётся $\zeta_0 \in E \cap \overline{f(B(x_0, r) \cap D)}$. Тогда $\zeta_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \zeta_k$, где $\zeta_k \in f(B(x_0, r) \cap D)$. Отсюда $\zeta_k = f(\xi_k)$, $\xi_k \in B(x_0, r) \cap D$. Так как $\overline{D}$ – компакт, то из последовательности ξ_k можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\xi_{k_l} \rightarrow \xi_0 \in \overline{B(x_0, r) \cap D}$. Случай $\xi_0 \in \partial D$ невозможен, поскольку f – замкнутое отображение и, значит, сохраняет границу: $C(f, \partial D) \subset \partial f(D)$, но у нас ζ_0 – внутренняя точка D' . Пусть ξ_0 – внутренняя точка D . По непрерывности отображения f имеем $f(\xi_0) = \zeta_0$. Но тогда одновременно $\xi_0 \in B(x_0, \varepsilon_0) \cap D$ и $\xi_0 \in f^{-1}(E)$, что противоречит выбору ε_0 . Таким образом, $E \cap \overline{f(B(x_0, r) \cap D)} = \emptyset$ и, значит,

$$E \subset D' \setminus \overline{f(B(x_0, r) \cap D)}, r \in (0, \varepsilon_0). \quad (18)$$

Из (18), в частности, вытекает, что множества E и $f(\sigma_m)$ не пересекаются.

Заметим также, что при произвольном $r \in (r_m, \varepsilon_0)$ множество $A_r := \partial(f(B(x_0, r) \cap D)) \cap D'$ отделяет E и $f(\sigma_m)$ в D' . Действительно,

$$D' = B_r \cup A_r \cup C_r \quad \forall \quad r \in (r_m, \varepsilon_0),$$

где множества $B_r := f(B(x_0, r) \cap D)$ и $C_r := D' \setminus \overline{f(B(x_0, r) \cap D)}$ открыты в D' , $f(\sigma_m) \subset B_r$, $E \subset C_r$ и A_r замкнуто в D' .

Пусть Σ_m – семейство всех множеств, отделяющих $f(\sigma_m)$ от E в D' . Поскольку f – открытое замкнутое отображение, мы получим, что

$$(\partial f(B(x_0, r) \cap D)) \cap D' \subset f(S(x_0, r) \cap D), r > 0. \quad (19)$$

Действительно, пусть $\zeta_0 \in (\partial f(B(x_0, r) \cap D)) \cap D'$. Тогда найдётся последовательность $\zeta_k \in f(B(x_0, r) \cap D)$ такая, что $\zeta_k \rightarrow \zeta_0$ при $k \rightarrow \infty$, где $\zeta_k = f(\xi_k)$, $\xi_k \in B(x_0, r) \cap D$. Не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что $\xi_k \rightarrow \xi_0$ при $k \rightarrow \infty$. Заметим, что случай $\xi_0 \in \partial D$ невозможен, поскольку в этом случае $\zeta_0 \in C(f, \partial D)$, что противоречит замкнутости отображения f . Тогда $\xi_0 \in D$. Возможны две ситуации: 1) $\xi_0 \in B(x_0, r) \cap D$ и 2) $\xi_0 \in S(x_0, r) \cap D$. Заметим, что случай 1) невозможен, поскольку, в этом случае, $f(\xi_0) = \zeta_0$ и ζ_0 – внутренняя точка множества $f(B(x_0, r) \cap D)$, что противоречит выбору ζ_0 . Таким образом, включение (19) установлено.

Здесь и далее объединения вида $\bigcup_{r \in (r_1, r_2)} \partial f(B(x_0, r) \cap D) \cap D'$ понимаются как семейства множеств. Пусть $\rho^{n-1} \in \widetilde{\text{adm}} \bigcup_{r \in (r_m, \varepsilon_0)} \partial f(B(x_0, r) \cap D) \cap D'$ в смысле соотношения (7), тогда также $\rho \in \text{adm} \bigcup_{r \in (r_m, \varepsilon_0)} \partial f(B(x_0, r) \cap D) \cap D'$ в смысле соотношения (1) при

$k = n - 1$. Ввиду (19) мы получим, что $\rho \in \text{adm} \bigcup_{r \in (r_m, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D)$ и, следовательно, так как $\widetilde{M}_q(\Sigma_m) \geq M_{q(n-1)}(\Sigma_m)$ при произвольном $q \geq 1$, то

$$\begin{aligned} & \widetilde{M}_{p/(n-1)}(\Sigma_m) \geq \\ & \geq \widetilde{M}_{p/(n-1)} \left(\bigcup_{r \in (r_m, \varepsilon_0)} \partial f(B(x_0, r) \cap D) \cap D' \right) \geq \\ & \geq \widetilde{M}_{p/(n-1)} \left(\bigcup_{r \in (r_m, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D) \right) \geq M_p \left(\bigcup_{r \in (r_m, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D) \right). \end{aligned} \quad (20)$$

Однако, ввиду (8) и (9), учитывая, что $p > n - 1$, имеем

$$\widetilde{M}_{p/(n-1)}(\Sigma_m) = \frac{1}{(M_\alpha(\Gamma(f(\sigma_m), E, D'))^{1/(\alpha-1)})}. \quad (21)$$

По лемме 1

$$\begin{aligned} & M_p \left(\bigcup_{r \in (r_m, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D) \right) \geq \\ & \geq \int_{r_m}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{\|Q\|_s(r)} = \int_{r_m}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{\omega_{n-1}^{\frac{p-n+1}{n-1}} t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \widetilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} \quad \forall m \in \mathbb{N}, s = \frac{n-1}{p-n+1}, \end{aligned} \quad (22)$$

$\alpha = p/(p-n+1)$, где $\|Q\|_s(r) = \left(\int_{D(x_0, r)} Q^s(x) dA \right)^{\frac{1}{s}}$ – L_s -норма функции Q над сферой

$D(x_0, r) := S(x_0, r) \cap D$. Из условий (12) вытекает, что $\int_{r_m}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{\omega_{n-1}^{\frac{p-n+1}{n-1}} t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \widetilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} \rightarrow \infty$ при $m \rightarrow \infty$.

Из соотношений (20) и (22) следует, что $\widetilde{M}_{p/(n-1)}(\Sigma_m) \rightarrow \infty$ при $m \rightarrow \infty$, однако, в таком случае, из (21) следует, что $M_\alpha(\Gamma(f(\sigma_m), E, D')) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$, что противоречит неравенству (17). Полученное противоречие опровергает предположение, что предельное множество $C(f, P)$ состоит более чем из одной точки.

Рассмотрим теперь случай 2), а именно, пусть теперь $Q^s \in FMO(\partial D)$, $s = (n-1)/(p-n+1)$. Покажем, что в этом случае выполнено второе условие в (12). Для этой цели воспользуемся предложением 2. Согласно этому предложению для любой неотрицательной измеримой функции $\eta : (\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow [0, \infty]$ удовлетворяющей условию

$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \eta(t) dt = 1$, выполнено неравенство

$$\frac{\omega_{n-1}}{J^{\alpha-1}} \leq \int_{A(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0)} Q^s(x) \cdot \eta^\alpha(|x - x_0|) dm(x), \quad (23)$$

где $s = (n-1)/(p-n+1)$, $J := J(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{r^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \widetilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(r)}$, а $\widetilde{q}_{x_0}(r)$ – среднее значение

функции Q^s над $S(x_0, r) \cap D$. Положим $\psi(t) := \frac{1}{(t \log \frac{1}{t})^{n/\alpha}}$, $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt \geq \log \frac{\log \frac{1}{\varepsilon}}{\log \frac{1}{\varepsilon_0}}$

и $\eta(t) := \psi(t)/I(\varepsilon, \varepsilon_0)$. Заметим, что $\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \eta(t) dt = 1$, кроме того, для функций класса $FMО$, как известно,

$$\int_{\varepsilon < |x| < \varepsilon_0} \frac{Q^s(x + x_0) dm(x)}{\left(|x| \log \frac{1}{|x|}\right)^n} = O\left(\log \log \frac{1}{\varepsilon}\right) \quad (24)$$

при $\varepsilon \rightarrow 0$ и для некоторого $\varepsilon_0 > 0$, $\varepsilon_0 \leq \text{dist}(0, \partial D)$. Исходя из (24) правая часть соотношения (23) стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$ и выбранной функции η . Но тогда из (23) неизбежно следует, что $\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{r^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(r)} \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Повторяя рассуждения от начала доказательства до соотношений (20) и (22), мы заключаем из этих соотношений, что снова $\widetilde{M}_{p/(n-1)}(\Sigma_m) \rightarrow \infty$ при $m \rightarrow \infty$. Однако, в таком случае, из (21) следует, что $M_{\alpha}(\Gamma(f(\sigma_m), E, D')) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$, что противоречит неравенству (17). Полученное противоречие опровергает предположение, что предельное множество $C(f, P)$ состоит более чем из одной точки. Таким образом, утверждение теоремы о возможности непрерывного продолжения отображения до отображения $f : \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$ в случае 2) также установлено.

Для завершения доказательства необходимо показать равенство $f(\overline{D}_P) = \overline{D}'$. Очевидно, $f(\overline{D}_P) \subset \overline{D}'$. Покажем обратное включение. Пусть $\zeta_0 \in \overline{D}'$. Если ζ_0 – внутренняя точка области D' , то, очевидно, существует $\xi_0 \in D$ так, что $f(\xi_0) = \zeta_0$ и, значит, $\zeta_0 \in f(D)$. Пусть теперь $\zeta_0 \in \partial D'$, тогда найдётся последовательность $\zeta_m \in D'$, $\zeta_m = f(\xi_m)$, $\xi_m \in D$, такая, что $\zeta_m \rightarrow \zeta_0$ при $m \rightarrow \infty$. Поскольку $\overline{D}_P$ – компакт (см. замечания, сделанные перед формулировкой теоремы 1), то можно считать, что $\xi_m \rightarrow P_0$, где P_0 – некоторый простой конец в $\overline{D}_P$. Тогда также $\zeta_0 \in f(\overline{D}_P)$. Включение $\overline{D}' \subset f(\overline{D}_P)$ доказано и, значит, $f(\overline{D}_P) = \overline{D}'$. Теорема доказана. $\square$

Доказательство следующей леммы аналогично доказательству [18, теорема 5] и потому опускается.

Лемма 2. Пусть D – область в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $\varphi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ – неубывающая функция, удовлетворяющая условию (3). Если $p > n-1$, то каждое открытое дискретное отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ с конечным искажением класса $W_{loc}^{1, \varphi}$ такое, что $N(f, D) < \infty$, является нижним Q -отображением относительно p -модуля в каждой точке $x_0 \in \overline{D}$ при

$$Q(x) = N(f, D) \cdot K_{I, \alpha}^{\frac{p-n+1}{n-1}}(x, f),$$

$\alpha := \frac{p}{p-n+1}$, где внутренняя дилатация $K_{I, \alpha}(x, f)$ отображения f в точке x порядка α определена соотношением (2), а кратность $N(f, D)$ определена вторым соотношением в (10).

Доказательство теоремы 1. По лемме 2 отображение f в каждой точке $x_0 \in D$ является нижним Q -отображением относительно p -модуля в каждой точке $x_0 \in \overline{D}$ при $Q(x) = N(f, D) \cdot K_{I, \alpha}^{\frac{p-n+1}{n-1}}(x, f)$, $\alpha := \frac{p}{p-n+1}$ (т.е., $p = \frac{\alpha(n-1)}{\alpha-1} > n-1$), где внутренняя дилатация $K_{I, \alpha}(x, f)$ отображения f в точке x порядка α определена соотношением

(2), а кратность $N(f, D)$ определена вторым соотношением в (10). Тогда необходимое заключение вытекает из теоремы 5, а также того факта, что максимальная кратность $N(f, D)$ замкнутого открытого дискретного отображения f конечна (см., напр., [30, лемма 3.3]). $\square$

4. О граничном поведении ещё одного класса отображений. Следующее определение восходит к О. Мартио, В. Рязанову, У. Сребро и Э. Якубову и имеет важное значение при изучении классов Соболева (см. [31]). Здесь и далее

$$A(x_0, r_1, r_2) := \{x \in \mathbb{R}^n : r_1 < |x - x_0| < r_2\} . \quad (25)$$

Введём в рассмотрение следующую конструкцию, см. [9, разд. 7.6 гл 7]. Пусть $p \geq 1$, Q – заданная измеримая по Лебегу функция. Говорят, что отображение $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$ есть *кольцевое Q -отображение в точке $x_0 \in \overline{D}$ относительно p -модуля*, $x_0 \neq \infty$, если для некоторого $r_0 = r(x_0)$ и произвольных сферического кольца $A = A(x_0, r_1, r_2)$, центрального в точке x_0 , радиусов: r_1, r_2 , $0 < r_1 < r_2 < r_0 = r(x_0)$, и любых континуумов $E_1 \subset \overline{B(x_0, r_1)} \cap D$, $E_2 \subset (\overline{\mathbb{R}^n} \setminus B(x_0, r_2)) \cap D$, отображение f удовлетворяет соотношению

$$M_p(f(\Gamma(E_1, E_2, D))) \leq \int_A Q(x) \cdot \eta^p(|x - x_0|) dm(x) \quad (26)$$

для каждой измеримой функции $\eta : (r_1, r_2) \rightarrow [0, \infty]$, такой что

$$\int_{r_1}^{r_2} \eta(r) dr \geq 1 . \quad (27)$$

Соотношению (26), в частности, все открытые дискретные отображения $f \in W_{loc}^{1,n}(D)$, мера множества точек ветвления которых равна нулю и внутренняя дилатация $K_I(x, f)$ которых локально интегрируема (см. [31, теорема 1 и следствие 2]). Следующее утверждение для случая гомеоморфизмов на плоскости доказано в [17, лемма 5.1]. В нашем случае речь идёт о ситуации пространства $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, для отображений со значительно более общими топологическими свойствами.

Лемма 3. Пусть $n \geq 2$, $p \geq 1$, область $D \subset \mathbb{R}^n$ регулярна, а $D' \subset \mathbb{R}^n$ ограничена и имеет локально квазиконформную границу, являющуюся сильно достижимой относительно p -модуля. Пусть также отображение $f : D \rightarrow D'$, $D' = f(D)$, является кольцевым Q -отображением относительно p -модуля во всех точках $x_0 \in \partial D$, кроме того, f является открытым, дискретным и замкнутым. Тогда f продолжается до непрерывного отображения $f : \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$, $f(\overline{D}_P) = \overline{D}'_P$, если найдётся измеримая по Лебегу функция $\psi : (0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ такая, что

$$I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt < \infty \quad (28)$$

при всех $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ и, кроме того, $I(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, и при $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\int_{\varepsilon < |x - x_0| < \varepsilon_0} Q(x) \cdot \psi^p(|x - x_0|) dm(x) = o(I^p(\varepsilon, \varepsilon_0)) . \quad (29)$$

Доказательство. Так как D' имеет локально квазиконформную границу, то $\overline{D'}_P = \overline{D'}$ (см. [21, теорема 4.1]). В силу метризуемости пространства $\overline{D}_P$ достаточно доказать, что для каждого простого конца P области D предельное множество

$$L = C(f, P) := \left\{ y \in \mathbb{R}^n : y = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k), x_k \rightarrow P, x_k \in D \right\}$$

состоит из единственной точки $y_0 \in \partial D'$. Заметим, что $L \neq \emptyset$ в силу компактности множества $\overline{D'}$, и L является подмножеством $\partial D'$ ввиду замкнутости отображения f (см. [22, теорема 3.3]). Предположим, что существуют, по крайней мере, две точки y_0 и $z_0 \in L$. То есть, найдётся не менее двух последовательностей $x_k, x'_k \in D$, таких, что $x_k \rightarrow P$ и $x'_k \rightarrow P$ при $k \rightarrow \infty$, и при этом, $f(x_k) \rightarrow y_0$ и $f(x'_k) \rightarrow z_0$ при $k \rightarrow \infty$. В силу [16, лемма 2] каждый простой конец P регулярной области D в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, содержит цепь разрезов σ_k , лежащую на сферах S_k с центром в некоторой точке $x_0 \in \partial D$ и с евклидовыми радиусами $r_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Пусть D_k – области, ассоциированные с разрезами σ_k , $k = 1, 2, \dots$. Не ограничивая общности рассуждений, переходя к подпоследовательности, если это необходимо, мы можем считать, что $x_k, x'_k \in D_k$. В самом деле, так как последовательности x_k и x'_k сходятся к простому концу P , найдётся номер $k_1 \in \mathbb{N}$ такой, что $x_{k_1}, x'_{k_1} \in D_1$. Далее, найдётся номер $k_2 \in \mathbb{N}$, $k_2 > k_1$, такой, что $x_{k_2}, x'_{k_2} \in D_2$. И так далее. Вообще, на m -м шаге мы найдём номер $k_m \in \mathbb{N}$, $k_m > k_{m-1}$, такой, что $x_{k_m}, x'_{k_m} \in D_m$. Продолжая этот процесс, мы получим две последовательности x_{k_m} и x'_{k_m} , принадлежащие области D_m , сходящиеся к P при $m \rightarrow \infty$ и такие, что $f(x_{k_m}) \rightarrow y_0$ и $f(x'_{k_m}) \rightarrow z_0$ при $m \rightarrow \infty$. Переобозначая, если это необходимо, $x_{k_m} \mapsto x_m$, мы получаем последовательность x_m с требуемыми свойствами.

Отметим, что y_0 и $z_0 \in \partial D'$, поскольку по условию $C(f, \partial D) \subset \partial D'$. По определению сильно достижимой границы в точке $y_0 \in \partial D'$, для любой окрестности U этой точки найдутся компакт $C'_0 \subset D'$, окрестность V точки y_0 , $V \subset U$, и число $\delta > 0$ такие, что

$$M_p(\Gamma(C'_0, F, D')) \geq \delta > 0 \quad (30)$$

для произвольного континуума F , пересекающего ∂U и ∂V . В силу предположения $C(f, \partial D) \subset \partial D'$, имеем, что для $C_0 := \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{C'_0}$ выполнено условие $C_0 \cap \partial D = \emptyset$ (см. [22, теорема 3.3]). Поскольку $I(P) = \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{D_m} \subset \partial D$ (см. [16, предложение 1]), то не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что $C_0 \cap \overline{D_k} = \emptyset$ для каждого $k \in \mathbb{N}$. Соединим точки x_k и x'_k кривой γ_k , лежащей в D_k . Заметим, что $f(x_k) \in V$ и $f(x'_k) \in D \setminus \overline{U}$ при всех достаточно больших $k \in \mathbb{N}$. В таком случае, найдётся номер $k_0 \in \mathbb{N}$, такой, что согласно (30)

$$M_p(\Gamma(C'_0, |f(\gamma_k)|, D')) \geq \delta > 0 \quad (31)$$

при всех $k \geq k_0 \in \mathbb{N}$. Обозначим через Γ_k семейство всех полуоткрытых кривых $\beta : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ таких, что $\beta(a) \in |f(\gamma_k)|$, $\beta(t) \in D'$ при всех $t \in [a, b)$ и, кроме того, $\lim_{t \rightarrow b-0} \beta(t) := B \in C'_0$. Очевидно, что

$$M_p(\Gamma_k) = M_p(\Gamma(C'_0, |f(\gamma_k)|, D')) . \quad (32)$$

При каждом фиксированном $k \in \mathbb{N}$, $k \geq k_0$, рассмотрим семейство Γ'_k (полных) поднятий $\alpha : [a, b) \rightarrow D$ семейства Γ_k с началом во множестве $|\gamma_k|$, т.е., $f \circ \alpha = \beta$, $\beta \in \Gamma_k$ и $\alpha(a) \in |\gamma_k|$. Поскольку f – замкнутое отображение, то оно сохраняет границу (см. [22, теорема 3.3]) и, значит, кривая α лежит в D вместе со своим замыканием. Более того, в силу дискретности отображения f кривая α может быть продолжена до непрерывной кривой $\bar{\alpha} : [a, b] \rightarrow D$. Заметим, что по определению $\bar{\beta}(b) \in C'_0$, так что $\bar{\alpha}(b) \in C_0$ по определению множества C_0 . Значит, $\bar{\alpha} \in \Gamma(|\gamma_k|, C_0, D)$, где $\bar{\alpha}$ обозначает продолженную кривую $\bar{\alpha} : [a, b] \rightarrow D$. Погрузим компакт C_0 в некоторый континуум C_1 , всё ещё полностью лежащий в области D (см. [32, лемма 1]). Можно снова считать, что $C_1 \cap \overline{D_k} = \emptyset$, $k = 1, 2, \dots$. Заметим, что $\Gamma(|\gamma_k|, C_0, D) > \Gamma(\sigma_k, C_1, D)$, при этом, $|\gamma_k|$ и C_0 – континуумы в D , а σ_k – разрез соответствующий области D_k . Поэтому к семейству кривых $\Gamma(\sigma_k, C_1, D)$ можно применить определение кольцевого Q -отображения (26). В связи с этим, заметим, что $\sigma_k \in S(x_0, r_k)$ для некоторой точки $x_0 \in \partial D$ и некоторой последовательности $r_k > 0$, $r_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$ (см. [16, лемма 2]). Здесь, не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что $\text{dist}(x_0, C_1) > \varepsilon_0$. Кроме того, заметим, что функция

$$\eta_k(t) = \begin{cases} \psi(t)/I(r_k, \varepsilon_0), & t \in (r_k, \varepsilon_0), \\ 0, & t \in \mathbb{R} \setminus (r_k, \varepsilon_0), \end{cases}$$

где $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt$, удовлетворяет условию нормировки вида (27). По доказанному $\Gamma'_k \subset \Gamma(|\gamma_k|, C_0, D)$, так что $M_p(f(\Gamma'_k)) \leq M_p(f(\Gamma(|\gamma_k|, C_0, D)))$. Поэтому, в силу определения кольцевого Q -отображения в граничной точке относительно p -модуля, а также ввиду условий (28)–(29),

$$M_p(f(\Gamma'_k)) \leq M_p(f(\Gamma(|\gamma_k|, C_0, D))) \leq M_p(f(\Gamma(\sigma_k, C_1, D))) \leq \Delta(k), \quad (33)$$

где $\Delta(k) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Однако, $\Gamma_k = f(\Gamma'_k)$, поэтому из (33) получим, что при $k \rightarrow \infty$

$$M_p(\Gamma_k) = M_p(f(\Gamma'_k)) \leq \Delta(k) \rightarrow 0. \quad (34)$$

Однако, соотношение (34) вместе с равенством (32) противоречат неравенству (31), что и доказывает лемму. $\square$

Доказательство теоремы 2. В первом случае полагаем $\psi(r) = \frac{1}{r^{\frac{n-1}{p-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(r)}$ при $r \in (0, \varepsilon_0)$ и $\psi(r) = 0$ при $r > \varepsilon_0$. В обозначениях леммы 3 $I := I(\varepsilon, \varepsilon_0) = \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{r^{\frac{n-1}{p-1}} q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(r)}$, где

$q_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1}r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q(x) d\mathcal{H}^{n-1}$, Тогда

$$\frac{\omega_{n-1}}{I^{p-1}} = \frac{1}{I^p} \int_{\varepsilon < |x-x_0| < \varepsilon_0} Q(x) \cdot \psi^p(|x-x_0|) dm(x) \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0. \quad (35)$$

Из (35) с учётом (4) вытекает, что оба условия (28)–(29) выполнены и, таким образом, случай 1) вытекает непосредственно из леммы 3.

Рассмотрим случай 2). Заметим, что для функций класса FMO в точке x_0 выполнено условие (24) при $\varepsilon \rightarrow 0$ и для некоторого $e_0 > 0$, $e_0 \leq \text{dist}(0, \partial D)$. При $\varepsilon_0 < e_0$ полагаем $\psi(t) := \frac{1}{(t \log \frac{1}{t})^{n/p}}$, $I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt \geq \log \frac{\log \frac{1}{\varepsilon}}{\log \frac{1}{\varepsilon_0}}$ и $\eta(t) := \psi(t)/I(\varepsilon, \varepsilon_0)$. Заметим, что $\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \eta(t) dt = 1$, кроме того, из соотношения (24) вытекает, что

$$\frac{1}{I^p(\varepsilon, \varepsilon_0)} \int_{\varepsilon < |x| < \varepsilon_0} Q(x+x_0) \cdot \psi^p(|x|) dm(x) \leq C \left(\log \log \frac{1}{\varepsilon} \right)^{1-p} \rightarrow 0 \quad (36)$$

при $\varepsilon \rightarrow 0$. Итак, из (36) вытекает выполнение условий (28)–(29) леммы 3, откуда и следует случай 2). Теорема доказана. $\square$

5. О равностепенной непрерывности отображений в замыкании области с сильно достижимой границей. Наша ближайшая цель – установить свойство равностепенной непрерывности семейств отображений, удовлетворяющих оценкам вида (6), а также классов Орлича–Соболева $W_{loc}^{1,\varphi}$. Речь идёт о равностепенной непрерывности не только во внутренних точках области, но и в её замыкании. Всюду далее, если не оговорено противное, d – одна из метрик в пространстве простых концов в заданной области D , упомянутых перед формулировкой теоремы 1, а d' – евклидова метрика.

Перед тем, как переходить к формулировке и доказательству основных утверждений настоящего раздела, сформулируем следующее утверждение, доказательство которого аналогично случаю гомеоморфизмов при $p = n$ (см. [18, следствие 5]).

Теорема 6. Пусть $x_0 \in \partial D$, ограниченное отображение $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ является нижним Q -гомеоморфизмом относительно p -модуля в области $D \subset \mathbb{R}^n$, $Q \in L_{loc}^{\frac{n-1}{p-n+1}}(\mathbb{R}^n)$, $p > n-1$ и $\alpha := \frac{p}{p-n+1}$. Тогда f является кольцевым $Q^{\frac{n-1}{p-n+1}}$ -гомеоморфизмом в этой же точке.

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon_0 \in (0, d_0)$, $d_0 = \sup_{x \in D} |x - x_0|$. Пусть $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ и пусть континуумы C_1 и C_2 удовлетворяют условиям $C_1 \subset \overline{B(x_0, \varepsilon) \cap D}$ и $C_2 \subset D \setminus B(x_0, \varepsilon_0)$. Рассмотрим семейство множеств $\Gamma_\varepsilon := \bigcup_{r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)} \{f(S(x_0, r) \cap D)\}$. Заметим, что множество $\sigma_r := f(S(x_0, r) \cap D)$ замкнуто в $f(D)$ как гомеоморфный образ замкнутого множества $S(x_0, r) \cap D$ в D . Кроме того, заметим, что σ_r при $r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)$ отделяет $f(C_1)$ от $f(C_2)$ в $f(D)$, поскольку

$$f(C_1) \subset f(B(x_0, r) \cap D) := A, \quad f(C_2) \subset f(D) \setminus \overline{f(B(x_0, r) \cap D)} := B,$$

A и B открыты в $f(D)$ и

$$f(D) = A \cup \sigma_r \cup B.$$

Пусть Σ_ε – семейство всех множеств, отделяющих $f(C_1)$ от $f(C_2)$ в $f(D)$. Пусть $\rho^{n-1} \in \widetilde{\text{adm}} \bigcup_{r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D)$ в смысле соотношения (7), тогда также $\rho \in \text{adm} \bigcup_{r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D)$ в смысле соотношения (1) при $k = n-1$. Следовательно, так как $\widetilde{M}_q(\Sigma_\varepsilon) \geq M_{q(n-1)}(\Sigma_\varepsilon)$ при произвольном $q \geq 1$, то

$$\begin{aligned} & \widetilde{M}_{p/(n-1)}(\Sigma_\varepsilon) \geq \\ & \geq \widetilde{M}_{p/(n-1)} \left(\bigcup_{r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D) \right) \geq M_p \left(\bigcup_{r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D) \right). \end{aligned} \quad (37)$$

Однако, ввиду (8) и (9),

$$\widetilde{M}_{p/(n-1)}(\Sigma_\varepsilon) = \frac{1}{(M_\alpha(\Gamma(f(C_1), f(C_2), f(D))))^{1/(\alpha-1)}}, \alpha = p/(p-n+1).$$

По лемме 1

$$\begin{aligned} & M_p \left(\bigcup_{r \in (\varepsilon, \varepsilon_0)} f(S(x_0, r) \cap D) \right) \geq \\ & \geq \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{\|Q\|_s(r)} = \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{\omega_{n-1}^{\frac{p-n+1}{n-1}} t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \widetilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} \quad \forall i \in \mathbb{N}, s = \frac{n-1}{p-n+1}, \end{aligned} \quad (38)$$

где $\|Q\|_s(r) = \left(\int_{D(x_0, r)} Q^s(x) d\mathcal{A} \right)^{\frac{1}{s}}$ – L_s -норма функции Q над сферой $S(x_0, r) \cap D$, а $\widetilde{q}_{x_0}(r)$ – её среднее значение над этой сферой. Тогда из (37)–(38) вытекает, что

$$M_\alpha(\Gamma(f(C_1), f(C_2), f(D))) \leq \frac{\omega_{n-1}}{I^{\alpha-1}}, \quad (39)$$

где $I = \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{r^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \widetilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(r)}$. Заметим, что $f(\Gamma(C_1, C_2, D)) = \Gamma(f(C_1), f(C_2), f(D))$, так что из (39) вытекает, что

$$M_\alpha(f(\Gamma(C_1, C_2, D))) \leq \frac{\omega_{n-1}}{I^{\alpha-1}}.$$

Завершает доказательство применение предложения 2. $\square$

Ниже мы ограничимся ситуацией, когда все рассматриваемые отображения являются гомеоморфизмами. Для $n-1 < p$, областей $D, D' \subset \mathbb{R}^n$, $z_1, z_2 \in D$, $z_1 \neq z_2$, $z'_1, z'_2 \in D'$ и произвольной измеримой по Лебегу функции Q обозначим символом $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ семейство всех нижних кольцевых Q -гомеоморфизмов $f : D \rightarrow D'$ относительно p -модуля в $\overline{D}$, $f(D) = D'$, таких что

$$f(z_1) = z'_1, \quad f(z_2) = z'_2. \quad (40)$$

Имеет место следующее утверждение.

Лемма 4. Пусть $n \geq 2$, область $D \subset \mathbb{R}^n$ регулярна, а область $D' \subset \mathbb{R}^n$ имеет локально квазиконформную границу, которая является сильно достижимой относительно α -модуля, $\alpha := \frac{p}{p-n+1}$. Предположим, $Q \in L_{loc}^{\frac{n-1}{p-n+1}}(\mathbb{R}^n)$, и что для каждого $x_0 \in \overline{D}$ найдется $\delta_0 = \delta(x_0) > 0$, такое, что при всех $\varepsilon \in (0, \delta_0)$ и некоторой измеримой по Лебегу функции $\psi : (0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$

$$0 < I(\varepsilon, \delta_0) := \int_{\varepsilon}^{\delta_0} \psi(t) dt < \infty, \quad I(\varepsilon, \delta_0) \rightarrow \infty \quad \text{при} \quad \varepsilon \rightarrow 0, \quad (41)$$

и, кроме того, при $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\int_{\varepsilon < |x-x_0| < \delta_0} Q^s(x) \cdot \psi^\alpha(|x-x_0|) dm(x) = o(I^\alpha(\varepsilon, \delta_0)), \quad (42)$$

$$\alpha := \frac{p}{p-n+1}, \quad s = \frac{n-1}{p-n+1}.$$

Тогда каждый элемент $f \in \mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ продолжается до непрерывного отображения $\bar{f}: \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$, при этом, $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$, состоящее из всех продолженных таким образом отображений, является равностепенно непрерывным, а значит, и нормальным в $\overline{D}_P$.

Доказательство. Во внутренних точках области D семейство $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ является равностепенно непрерывным по следующим соображениям: каждое отображение $f \in \mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ является так называемым $Q^{\frac{n-1}{p-n+1}}$ -гомеоморфизмом относительно α -модуля, $\alpha := \frac{p}{p-n+1}$ (см. [34, теорема 13.1] при $p = n$ и [35, теорема 7.1]), а семейства таких отображений (фиксирующих две и более точек при $p = n$, и произвольные семейства при $n-1 < p < n$) равностепенно непрерывны при условиях (41)–(42) на функцию Q (см. [34, лемма 6.1] и [36, лемма 2.4]). Возможность непрерывного граничного продолжения каждого элемента $f \in \mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ вытекает из [20, теорема 2 и соотношение (37)].

Покажем равностепенную непрерывность семейства $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$ в точках E_D , где E_D – пространство простых концов в области D . Не ограничивая общности, можно считать, что $\overline{D}'_P = \overline{D}'$. Предположим противное, а именно, что $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$ не является равностепенно непрерывным в некоторой точке $P_0 \in E_D$. Тогда найдутся число $a > 0$, последовательность $P_k \in \overline{D}_P$, $k = 1, 2, \dots$ и элементы $f_k \in \mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$ такие, что $d(P_k, P_0) < 1/k$ и

$$|f_k(P_k) - f_k(P_0)| \geq a \quad \forall \quad k = 1, 2, \dots, . \quad (43)$$

Ввиду возможности непрерывного продолжения каждого f_k на границу D в терминах простых концов, для всякого $k \in \mathbb{N}$ найдётся элемент $x_k \in D$ такой, что $d(x_k, P_k) < 1/k$ и $|f_k(x_k) - f_k(P_k)| < 1/k$. Тогда из (43) вытекает, что

$$|f_k(x_k) - f_k(P_0)| \geq a/2 \quad \forall \quad k = 1, 2, \dots, . \quad (44)$$

Аналогично, в силу непрерывного продолжения отображения f_k в $\overline{D}_P$ найдётся последовательность $x'_k \in D$, $x'_k \rightarrow P_0$ при $k \rightarrow \infty$ такая, что $|f_k(x'_k) - f_k(P_0)| < 1/k$ при $k = 1, 2, \dots$. Тогда из (44) вытекает, что

$$|f_k(x_k) - f_k(x'_k)| \geq a/4 \quad \forall \quad k = 1, 2, \dots,$$

где последовательности x_k и x'_k принадлежат D и сходятся к простому концу P_0 при $k \rightarrow \infty$. В силу компактности множества $\overline{D'}$ последовательность $f_k(P_0)$ имеет сходящуюся подпоследовательность $f_{k_l}(P_0)$, которая сходится к некоторой точке $y_0 \in \partial D'$ при $l \rightarrow \infty$. Поскольку $|f_k(x'_k) - f_k(P_0)| < 1/k$ при $k = 1, 2, \dots$, мы получим, что $f_{k_l}(x'_{k_l}) \rightarrow y_0$ при $l \rightarrow \infty$. Не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что сама последовательность $f_k(x'_k)$ сходится при $k \rightarrow \infty$ к y_0 .

Положим $U = B(y_0, r_0)$, где $0 < r_0 < a/4$. В силу [16, лемма 2] простой конец P_0 регулярной области D в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, содержит цепь разрезов σ_k , лежащую на сферах S_k с центром в некоторой точке $x_0 \in \partial D$ и с евклидовыми радиусами $r_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Пусть D_k – области, ассоциированные с разрезами σ_k , $k = 1, 2, \dots$. Поскольку последовательности x_k и x'_k сходятся к простому концу P_0 при $k \rightarrow \infty$, мы можем считать, что точки $y_k = f_k(x_k)$ и $y'_k = f_k(x'_k)$ принадлежат области $D'_k = f(D_k)$. Соединим точки y_k и y'_k кривой C_k , полностью лежащей в D'_k . Заметим, что по построению $\partial U \cap |C_k| \neq \emptyset$ (как обычно, $|C_k|$ обозначает носитель кривой C_k).

Поскольку область D' сильно достижима относительно α -модуля, существует континуум $E \subset D'$ и число $\delta > 0$, такие, что

$$M_\alpha(\Gamma(E, |C_k|, D')) \geq \delta \quad (45)$$

для всех достаточно больших k .

Без ограничения общности можем считать, что последнее условие выполнено для всех $k = 1, 2, \dots$. Заметим, что поскольку семейство отображений $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ равномерно непрерывно в области D , а $\overline{D'}$ является компактом, то $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ нормально в этой области (см. [28, теорема 20.4]). Следовательно, не ограничивая общности, можно считать, что последовательность f_k сходится локально равномерно к некоторому непрерывному отображению f , более того, предельное отображение f является гомеоморфизмом или постоянной в D (см. [37, теорема 1] при $p \neq n$ и [34, лемма 4.2] при $p = n$). Так как f_m удовлетворяют условиям нормировки (40), отображение f является гомеоморфизмом. Тогда также $f_k^{-1} \rightarrow f^{-1}$ при $k \rightarrow \infty$ (см. [34, лемма 3.1]). Ввиду включения $E \subset f(D)$, компакты $K_k := f_k^{-1}(E)$ при $k \rightarrow \infty$ сходятся к компакту $f^{-1}(E)$ в смысле хаусдорфовой метрики. Тогда при всех $k \geq k_0$ все множества K_k принадлежат некоторой ε -окрестности компакта $f^{-1}(E)$, замыкание которой мы обозначим через K_0 . Можно считать, что K_0 – компакт в D . Учитывая, что $x_0 \in \partial D$, имеем

$$\varepsilon_2 := \text{dist}(x_0, K_0) > 0.$$

Полагаем $\varepsilon_0 := \min\{\delta_0, \varepsilon_2\}$. Рассмотрим семейство кривых Γ_k , соединяющих множества K_k и $|f_k^{-1}(C_k)|$ в области D . Заметим, что $|f_k^{-1}(C_k)| \subset D_k$, $K_k \subset D \setminus B(x_0, \varepsilon_0)$ и $K_0 \subset$

$D \setminus B(x_0, \varepsilon_0)$, так что $\Gamma_k > \Gamma(S(x_0, r_k), K_k, D)$. Тогда при всех $k \geq k_0$

$$\begin{aligned} M_\alpha(f_k(\Gamma_k)) &\leq M_\alpha(f_k(\Gamma(S(x_0, r_k), K_k, D))) \leq \\ &\leq M_\alpha(f_k(\Gamma(S(x_0, r_k), K_0, D))) \leq \\ &\leq \int_{A(x_0, r_k, \varepsilon_0)} Q^{\frac{n-1}{p-n+1}}(x) \eta^\alpha(|x - x_0|) dm(x), \alpha = \frac{p}{p-n+1}, \end{aligned} \quad (46)$$

где $A(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \varepsilon < |x - x_0| < \varepsilon_0\}$ и $\eta : (r_k, \varepsilon_0) \rightarrow [0, \infty]$ – произвольная измеримая по Лебегу функция такая, что

$$\int_{r_k}^{\varepsilon_0} \eta(r) dr = 1.$$

Так как $I(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, то при достаточно малых $r_k > 0$ имеем: $I(r_k, \varepsilon_0) > 0$. Полагаем

$$\eta(t) = \begin{cases} \psi(t)/I(r_k, \varepsilon_0), & t \in (r_k, \varepsilon_0), \\ 0, & t \notin (r_k, \varepsilon_0). \end{cases}$$

В таком случае,

$$\int_{r_k}^{\varepsilon_0} \eta(t) dt = \frac{1}{I(r_k, \varepsilon_0)} \int_{r_k}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt = 1.$$

Тогда из (46) с учётом (42) следует, что при $k \rightarrow \infty$

$$M_\alpha(f_k(\Gamma_k)) \rightarrow 0. \quad (47)$$

Однако, $f_k(\Gamma_k) = \Gamma(E, |C_k|, D')$, откуда из (47) мы получаем, что

$$M_\alpha(\Gamma(E, |C_k|, D')) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad k \rightarrow \infty,$$

что противоречит соотношению (45). Полученное противоречие указывает на то, что изначальное предположение об отсутствии равностепенной непрерывности рассматриваемого семейства было неверным. $\square$

Из леммы 4 мы получаем следующее утверждение.

Теорема 7. Пусть $n \geq 2$, область $D \subset \mathbb{R}^n$ регулярна, а область $D' \subset \mathbb{R}^n$ имеет локально квазиконформную границу, которая является сильно достижимой относительно α -модуля, $\alpha := \frac{p}{p-n+1}$. Предположим, $Q \in L_{loc}^{\frac{n-1}{p-n+1}}(\mathbb{R}^n)$ и выполнено одно из следующих условий:

1) либо в каждой точке $x_0 \in \overline{D}$ при некотором $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(x_0) > 0$ и всех $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{\alpha-1}} \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{\alpha-1}}(t)} = \infty,$$

где $\tilde{q}_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q^{\frac{n-1}{p-n+1}}(x) d\mathcal{H}^{n-1}$;

2) либо $Q^{\frac{n-1}{p-n+1}} \in FMO(\overline{D})$.

Тогда каждый элемент $f \in \mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ продолжается до непрерывного отображения $\bar{f}: \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$, при этом, семейство отображений $\mathfrak{R}_{Q,p}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$, состоящее из всех продолженных таким образом отображений, является равностепенно непрерывным, а значит, и нормальным в $\overline{D}_P$.

Доказательство вытекает из леммы 4 по аналогии с доказательством теоремы 2. $\square$

Доказательство теоремы 3. По лемме 2 каждое $f \in \mathfrak{F}_{\varphi, Q, \alpha}^{z_1, z_2, z'_1, z'_2}(D, D')$ является нижним B -отображением относительно p -модуля при $B(x) = Q^{\frac{p-n+1}{n-1}}(x, f)$, где p находится из условия $\alpha = \frac{p}{p-n+1}$. Однако, относительно $B(x)$ выполнены условия 1) и 2) теоремы 7, поскольку $B^{\frac{n-1}{p-n+1}}(x) = Q(x)$, где Q удовлетворяет соотношениям 1)-2) теоремы 3. Оставшаяся часть утверждения вытекает из теоремы 7. $\square$

6. О равностепенной непрерывности нижних Q -отображений в QED -областях. В предыдущем параграфе речь шла об отображениях, фиксирующих два внутренних значения $z_1, z_2 \in D$. Значительно важнее, однако, было бы получить результаты в том случае, когда фиксируется только одна внутренняя точка заданной области. Сказанное иллюстрируется простым фактом из теории конформных отображений: например, хорошо известно, что существует и единственно отображение единичного круга на себя, фиксирующее одну внутреннюю и одну граничную точку единичного круга; однако, о существовании отображений, фиксирующих две и более внутренние точки, вообще говоря, ничего нельзя сказать (см. [38, пункт 10, § 3, гл. I]). В дальнейшем мы для простоты ограничимся случаем $p = n$, где p – порядок модуля семейств кривых.

Напомним, что *сферическое (хордальное)* расстояние между точками x и y в $\overline{\mathbb{R}^n} = \mathbb{R}^n \cup \{\infty\}$ есть величина

$$h(x, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |x|^2}}, \quad h(x, y) = \frac{|x - y|}{\sqrt{1 + |x|^2} \sqrt{1 + |y|^2}}, \quad x \neq \infty \neq y.$$

Хордальным диаметром множества $E \subset \overline{\mathbb{R}^n}$ называется величина

$$h(E) = \sup_{x, y \in E} h(x, y). \quad (48)$$

Предложение 3. Для любых непересекающихся невырожденных континуумов B и F в $\overline{\mathbb{R}^n}$ и некоторой постоянной $\lambda_n > 0$ имеет место соотношение:

$$M(\Gamma(F, B, \overline{\mathbb{R}^n})) \geq \frac{\omega_{n-1}}{\left[\log \frac{2\lambda_n^2}{h(F)h(B)} \right]^{n-1}},$$

см. [9, (7.29), разд. 7.4, гл. 7].

Имеет место следующее утверждение, обобщающее [20, лемма 3.1] в случае не локально связных границ.

Лемма 5. Пусть область D регулярна, область D' ограничена, имеет локально квазиконформную границу и, одновременно, является QED -областью. Пусть также P_0 – некоторый простой конец в E_D , а σ_m , $m = 1, 2, \dots$, – соответствующая ему цепь разрезов, лежащих на сферах с центром в некоторой точке $x_0 \in \partial D$ и радиусов $r_m \rightarrow 0$, $m \rightarrow \infty$. Пусть D_m – соответствующая P_0 последовательность ассоциированных областей, а C_m – произвольная последовательность континуумов, принадлежащих D_m .

Предположим, $Q \in L_{loc}^{n-1}(\mathbb{R}^n)$, $f : D \rightarrow D'$ – нижний Q -гомеоморфизм, $f(D) = D'$, такой что $b'_0 = f(b_0)$ для некоторых $b_0 \in D$ и $b'_0 \in D'$. Пусть также найдётся $\varepsilon_0 = \varepsilon(x_0) > 0$, такое, что при некотором $0 < p < n$ выполнено условие

$$\int_{A(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0)} Q^{n-1}(x) \cdot \psi^n(|x - x_0|) dm(x) \leq K \cdot I^p(\varepsilon, \varepsilon_0), \quad (49)$$

где сферическое кольцо $A(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0)$ определено как в (25), а ψ – некоторая неотрицательная измеримая функция, такая, что при всех $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$

$$I(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt < \infty, \quad (50)$$

при этом, $I(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Тогда найдётся число $\tilde{\varepsilon}_0 = \tilde{\varepsilon}_0(x_0) \in (0, \varepsilon_0)$ и $M_0 \in \mathbb{N}$ такие, что

$$h(f(C_m)) \leq \frac{\alpha_n}{\delta} \exp \left\{ -\beta_n I^{\gamma_{n,p}}(r_m, \varepsilon_0) \cdot (\alpha(r_m))^{-1/(n-1)} \right\} \quad \forall m \geq M_0, \quad (51)$$

где величина $h(f(C_m))$ в левой части (51) определена в (48),

$$\alpha(\sigma) = \left(1 + \frac{\int_{\tilde{\varepsilon}_0}^{\varepsilon_0} \psi(t) dt}{\int_{\sigma}^{\tilde{\varepsilon}_0} \psi(t) dt} \right)^n, \quad (52)$$

$\delta = \frac{1}{2} \cdot h(b'_0, \partial D')$, h – хордальное расстояние между множествами, α_n – некоторая постоянная, зависящая только от n , A – постоянная, участвующая в определении QED -области D' , см. (5), $\beta_n = \left(\frac{\omega_{n-1}}{KA} \right)^{\frac{1}{n-1}}$ и степень $\gamma_{n,p} = 1 - \frac{p-1}{n-1}$.

Доказательство. Прежде всего, в сделанных выше обозначениях положим $\eta_\varepsilon(t) = \psi(t)/I(\varepsilon, \varepsilon_0)$. Тогда при каждом $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ согласно предложению 2 (см. также [9, лемма 7.4])

$$\frac{\omega_{n-1}}{J^{n-1}} \leq \frac{1}{I^n(\varepsilon, \varepsilon_0)} \int_{A(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0)} Q^{n-1}(x) \cdot \psi^n(|x - x_0|) dm(x), \quad (53)$$

где ω_{n-1} – площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$,

$$J = J(\varepsilon, \varepsilon_0) := \int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dr}{r \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{n-1}}(r)},$$

$$\tilde{q}_{x_0}(r) = \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q^{n-1}(x) d\mathcal{H}^{n-1}, \quad (54)$$

$A(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \varepsilon < |x - x_0| < \varepsilon_0\}$. В силу условия (49) и того, что $I(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, правая часть соотношения (53) стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$. В таком случае, из (53) следует, что $J(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$. Тогда ввиду [16, теорема 3] отображение f продолжается до гомеоморфизма $\overline{D}_P$ на $\overline{D}'_P$. В частности, поскольку область D' ограничена, отсюда следует, что пространство $\overline{D}_P$ содержит не менее двух простых концов P_1 и $P_2 \in E_D$, где E_D – пространство простых концов в области D .

Пусть теперь $P_1 \subset E_D$ – простой конец, не совпадающий с P_0 , где P_0 – фиксированный простой конец из условия леммы. Предположим, $G_m, m = 1, 2, \dots$, – последовательность областей, соответствующая простому концу P_1 и $x_m \in D$ – произвольная последовательность точек, такая что $x_m \rightarrow P_1$ при $m \rightarrow \infty$. Можно считать, что $x_m \in G_m$ для всякого $m \in \mathbb{N}$. Тогда, так как f имеет непрерывное продолжение на $\overline{D}_P$, то $f(x_m) \rightarrow f(P_1)$ при $m \rightarrow \infty$. Из последнего соотношения вытекает, что $h(f(x_m), f(P_1)) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$. (Здесь, как и выше, мы отождествляем $f(P_1)$ с соответствующей точкой границы области D' , а хордальное расстояние $h(f(x_m), f(P_1))$ понимается как хордальное расстояние между $f(x_m)$ и этой точкой в $\overline{\mathbb{R}^n}$). Заметим, что при всех $m \geq m_0$ и некотором $m_0 \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} h(f(b_0), f(x_m)) &= h(b'_0, f(x_m)) \geq h(b'_0, f(P_1)) - h(f(x_m), f(P_1)) \geq \\ &\geq \frac{1}{2} \cdot h(b'_0, \partial D') := \delta, \end{aligned} \quad (55)$$

где $h(b'_0, \partial D')$ обозначает хордальное расстояние между b'_0 и $\partial D'$. Построим последовательность континуумов $K_m, m = 1, 2, \dots$, следующим образом. Соединим точку x_1 с точкой b_0 произвольной кривой в D , которую мы обозначим через K_1 . Далее, соединим точки x_2 и x_1 кривой K'_1 , лежащей в G_1 . Объединив кривые K_1 и K'_1 , получим кривую K_2 , соединяющую точки b_0 и x_2 . И так далее. Пусть на некотором шаге мы имеем кривую K_m , соединяющую точки x_m и b_0 . Соединим точки x_{m+1} и x_m кривой K'_m , лежащей в G_m . Объединяя между собой кривые K_m и K'_m , получим кривую K_{m+1} . И так далее.

Пусть $C_m, m = 1, 2, \dots$, – последовательность континуумов в областях D_m , заданная по условию. Покажем, что найдётся номер $m_1 \in \mathbb{N}$, такой что

$$D_m \cap K_m = \emptyset \quad \forall \quad m \geq m_1. \quad (56)$$

Предположим, что (56) не имеет места, тогда найдутся возрастающая последовательность номеров $m_k \rightarrow \infty, k \rightarrow \infty$, и последовательность точек $\xi_k \in K_{m_k} \cap D_{m_k}, m = 1, 2, \dots$. Тогда, с одной стороны, $\xi_k \rightarrow P_0$ при $k \rightarrow \infty$.

Рассмотрим следующую процедуру. Заметим, что возможны два случая: либо все элементы ξ_k при $k = 1, 2, \dots$ принадлежат множеству $D \setminus G_1$, либо найдётся номер k_1 такой, что $\xi_{k_1} \in G_1$. Далее, рассмотрим последовательность $\xi_k, k > k_1$. Заметим, что возможны два случая: либо ξ_k при $k > k_1$ принадлежат множеству $D \setminus G_2$, либо

найдётся номер $k_2 > k_1$ такой, что $\xi_{k_2} \in G_2$. И так далее. Предположим, элемент $\xi_{k_{l-1}} \in G_{l-1}$ построен. Заметим, что возможны два случая: либо ξ_k при $k > k_{l-1}$ принадлежат множеству $D \setminus G_l$, либо найдётся номер $k_l > k_{l-1}$ такой, что $\xi_{k_l} \in G_l$. И так далее. Эта процедура может быть как конечной (оборваться на каком-то $l \in \mathbb{N}$), так и бесконечной, в зависимости от чего мы имеем две ситуации:

- 1) либо найдутся номера $n_0 \in \mathbb{N}$ и $l_0 \in \mathbb{N}$ такие, что $\xi_k \in D \setminus G_{n_0}$ при всех $k > l_0$;
- 2) либо для каждого $l \in \mathbb{N}$ найдётся элемент ξ_{k_l} такой, что $\xi_{k_l} \in G_l$, причём последовательность k_l является возрастающей по $l \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим каждый из этих случаев и покажем, что в обоих из них мы приходим к противоречию. Пусть имеет место ситуация 1), тогда заметим, что все элементы последовательности ξ_k принадлежат K_{n_0} , откуда вытекает существование подпоследовательности ξ_{k_r} , $r = 1, 2, \dots$, сходящейся при $r \rightarrow \infty$ к некоторой точке $\xi_0 \in D$. Однако, с другой стороны $\xi_k \in D_{m_k}$ и, значит, $\xi_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{D_m} \subset \partial D$ (см. [16, предложение 1] по этому поводу). Полученное противоречие говорит о том, что случай 1) невозможен. Пусть имеет место случай 2), тогда одновременно $\xi_k \rightarrow P_0$ и $\xi_k \rightarrow P_1$ при $k \rightarrow \infty$. В силу непрерывного продолжения f на $\overline{D_P}$ отсюда имеем, что $f(\xi_k) \rightarrow f(P_0)$ и $f(\xi_k) \rightarrow f(P_1)$ при $k \rightarrow \infty$, откуда $f(P_0) = f(P_1)$, что противоречит гомеоморфности продолжения f в $\overline{D_P}$. Полученное противоречие указывает на справедливость соотношения (56).

Положим теперь $\tilde{\varepsilon}_0 = \min\{\varepsilon_0, r_{m_1+1}\}$, и пусть M_0 – натуральное число, такое что $r_m < \tilde{\varepsilon}_0$ при всех $m \geq M_0$. Рассмотрим измеримую функцию

$$\eta_m(t) = \begin{cases} \psi(t)/I(r_m, \tilde{\varepsilon}_0), & t \in (r_m, \tilde{\varepsilon}_0), \\ 0, & t \notin (r_m, \tilde{\varepsilon}_0), \end{cases}$$

где, как и прежде, величина $I(a, b)$ определяется соотношением $I(a, b) = \int_a^b \psi(t) dt$. Заметим, что функция $\eta_m(t)$ удовлетворяет соотношению вида (27), где вместо r_1 и r_2 участвуют r_m и $\tilde{\varepsilon}_0$, соответственно. Заметим, что ввиду соотношения (56), а также по определению разрезов $\sigma_m \subset r_m$, $\Gamma(C_m, K_m, D) > \Gamma(S(x_0, r_m), S(x_0, \tilde{\varepsilon}_0), D)$ и значит, $f(\Gamma(C_m, K_m, D)) > f(\Gamma(S(x_0, r_m), S(x_0, \tilde{\varepsilon}_0), D))$, откуда

$$M(f(\Gamma(C_m, K_m, D))) \leq M(f(\Gamma(S(x_0, r_m), S(x_0, \tilde{\varepsilon}_0), D)))$$

(см. [28, теорема 6.4]). В таком случае, согласно теореме 6, мы получим, что

$$\begin{aligned} M(\Gamma(f(C_m), f(K_m), D')) &= \\ &= M(f(\Gamma(C_m, K_m, D))) \leq M(f(\Gamma(S(x_0, r_m), S(x_0, \tilde{\varepsilon}_0), D))) \leq \\ &\leq \frac{K \cdot I^p(r_m, \varepsilon_0)}{I^n(r_m, \tilde{\varepsilon}_0)} = K \cdot I^{p-n}(r_m, \varepsilon_0) \cdot \alpha(r_m), \quad m \geq M_0, \end{aligned} \tag{57}$$

где $\alpha(r_m)$ определяется из соотношения (52) при $\sigma = r_m$. Т.к. по условию область $D' = f(D)$ является QED -областью, то при некоторой постоянной $A < \infty$, см. (5), из (57)

получим

$$M(\Gamma(f(C_m), f(K_m), \overline{\mathbb{R}^n})) \leq K \cdot A \cdot I^{p-n}(r_m, \varepsilon_0) \cdot \alpha(r_m). \quad (58)$$

Тогда, по предложению 3, из (58) получаем, что

$$\frac{\omega_{n-1}}{\left[\log \frac{2\lambda_n^2}{h(f(C_m))h(f(K_m))} \right]^{n-1}} \leq K \cdot A \cdot I^{p-n}(r_m, \varepsilon_0) \cdot \alpha(r_m), \quad m \geq M_0,$$

откуда

$$h(f(C_m)) \leq \frac{2\lambda_n^2}{h(f(K_m))} \exp \left\{ - \left(\frac{\omega_{n-1}}{KA} \right)^{\frac{1}{n-1}} I^{\frac{n-p}{n-1}}(r_m, \varepsilon_0) \cdot (\alpha(r_m))^{-\frac{1}{n-1}} \right\}, \quad (59)$$

$m \geq M_0$. Заметим, что ввиду (55), из (59) следует, что

$$h(f(C_m)) \leq \frac{2\lambda_n^2}{\delta} \exp \left\{ - \left(\frac{\omega_{n-1}}{KA} \right)^{\frac{1}{n-1}} I^{\frac{n-p}{n-1}}(r_m, \varepsilon_0) \cdot (\alpha(r_m))^{-\frac{1}{n-1}} \right\}, \quad m \geq M_0.$$

Лемма доказана. $\square$

Для заданных областей $D, D' \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, измеримой по Лебегу функции Q , $b_0 \in D$, $b'_0 \in D'$, обозначим через $\mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(D, D')$ семейство всех нижних Q -гомеоморфизмов $f : D \rightarrow D'$, таких что $f(D) = D'$, $b'_0 = f(b_0)$. В наиболее общей ситуации основное утверждение настоящего раздела может быть сформулировано следующим образом.

Лемма 6. Пусть область D регулярна, область D' ограничена, имеет локально квазиконформную границу и, одновременно, является QED -областью.

Предположим, что $Q \in L_{loc}^{n-1}(\mathbb{R}^n)$, и что для каждого $x_0 \in \overline{D}$ найдётся $\varepsilon_0 = \varepsilon(x_0) > 0$, такое, что при некотором $0 < p < n$ выполнено условие (49), где сферическое кольцо $A(x_0, \varepsilon, \varepsilon_0)$ определено как в (25), а ψ – некоторая неотрицательная измеримая функция, такая, что при всех $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ выполнено условие (50), при этом, $I(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Тогда каждое $f \in \mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(D, D')$ продолжается до гомеоморфизма $f : \overline{D}_P \rightarrow \overline{D}'_P$, при этом семейство таким образом продолженных отображений является равностепенно непрерывным в $\overline{D}_P$.

Доказательство. В силу условия (49) и того, что $I(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, правая часть соотношения (53) стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$. В таком случае, из (53) следует, что $J(\varepsilon, \varepsilon_0) \rightarrow \infty$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, где J определено в (54). Тогда ввиду [16, теорема 3] отображение $f \in \mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(D, D')$ продолжается до гомеоморфизма $\overline{D}_P$ на $\overline{D}'_P$. Равностепенная непрерывность семейства $\mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(D, D')$ во внутренних точках области D следует, например, из комбинации теоремы 6 и [9, лемма 7.6]. Осталось показать равностепенную непрерывность $\mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$ на E_D .

Предположим противное, а именно, что семейство $\mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$ не является равностепенно непрерывным в некоторой точке $P_0 \in E_D$. Тогда найдутся число $a > 0$, последовательность $P_k \in \overline{D}_P$, $k = 1, 2, \dots$ и элементы $f_k \in \mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(\overline{D}_P, \overline{D}'_P)$ такие, что $d(P_k, P_0) < 1/k$ и

$$|f_k(P_k) - f_k(P_0)| \geq a \quad \forall \quad k = 1, 2, \dots, \quad (60)$$

Ввиду возможности непрерывного продолжения каждого f_k на границу D в терминах простых концов, для всякого $k \in \mathbb{N}$ найдётся элемент $x_k \in D$ такой, что $d(x_k, P_k) < 1/k$ и $|f_k(x_k) - f_k(P_k)| < 1/k$. Тогда из (60) вытекает, что

$$|f_k(x_k) - f_k(P_0)| \geq a/2 \quad \forall \quad k = 1, 2, \dots, . \quad (61)$$

Аналогично, в силу непрерывного продолжения отображения f_k в $\overline{D_P}$ найдётся последовательность $x'_k \in D$, $x'_k \rightarrow P_0$ при $k \rightarrow \infty$ такая, что $|f_k(x'_k) - f_k(P_0)| < 1/k$ при $k = 1, 2, \dots$. Тогда из (61) вытекает, что

$$|f_k(x_k) - f_k(x'_k)| \geq a/4 \quad \forall \quad k = 1, 2, \dots, . \quad (62)$$

Пусть σ_m , $m = 1, 2, \dots$, – соответствующая P_0 цепь разрезов, лежащих на сферах с центром в некоторой точке $x_0 \in \partial D$ и радиусов $r_m \rightarrow 0$, $m \rightarrow \infty$. Пусть D_m – соответствующая P_0 последовательность ассоциированных областей. Не ограничивая общности рассуждений, можно считать, что x_k и x'_k принадлежат области D_k . Соединим точки x_k и x'_k кривой C_k лежащей в D_k . Тогда по лемме 5 мы получим, что $h(|f(C_k)|) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, что противоречит неравенству (62). Полученное противоречие указывает на то, что исходное предположение об отсутствии равностепенной непрерывности семейства $\mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(\overline{D_P}, \overline{D'_P})$ было неверным. $\square$

Из леммы 6 на основе рассуждений, приведённых при доказательстве теоремы 2, получаем следующее утверждение.

Теорема 8. Пусть область D регулярна, область D' ограничена, имеет локально квазиконформную границу и, одновременно, является QED -областью.

Предположим, что $Q \in L_{loc}^{n-1}(\mathbb{R}^n)$, и что для каждого $x_0 \in \overline{D}$ выполнено одно из следующих условий:

- 1) либо $Q^{n-1} \in FMO(\overline{D})$;
- 2) либо в каждой точке $x_0 \in \overline{D}$ при некотором $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(x_0) > 0$ и всех $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$

$$\int_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{n-1}}(t)} < \infty, \quad \int_0^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t \tilde{q}_{x_0}^{\frac{1}{n-1}}(t)} = \infty,$$

где $\tilde{q}_{x_0}(r) := \frac{1}{\omega_{n-1} r^{n-1}} \int_{|x-x_0|=r} Q^{n-1}(x) d\mathcal{H}^{n-1}$.

Тогда каждое $f \in \mathfrak{G}_{b_0, b'_0, Q}(D, D')$ продолжается до гомеоморфизма $f : \overline{D_P} \rightarrow \overline{D'_P}$, при этом семейство таким образом продолженных отображений является равностепенно непрерывным в $\overline{D_P}$.

Доказательство теоремы 4. Утверждение теоремы вытекает из теоремы 8. Действительно, согласно лемме 2 каждое $f \in \mathfrak{F}_{b_0, b'_0, \varphi, Q}(D, D')$ является нижним кольцевым $Q^{1/(n-1)}$ -отображением в $\overline{D}$. В таком случае, желанное заключение прямо вытекает из теоремы 8. $\square$

Список литературы

- [1] *Andreian Cazacu C.* On the length-area dilatation // Complex Var. Theory Appl. – 2005. – V. **50**. – P. 765–776.
- [2] *Bishop C.J., Gutlyanskii V.Ya., Martio O. and Vuorinen M.* On conformal dilatation in space // Int. J. Math. Math. Sci. – 2003. – V. **22**. – P. 1397–1420.
- [3] *Cristea M.* Local homeomorphisms having local ACL^n inverses // Complex Variables and Elliptic Equations. – 2008. – V. **53**, no. 1. – P. 77–99.
- [4] *Cristea M.* Open discrete mappings having local ACL^n inverses // Complex Variables and Elliptic Equations. – 2010. – V. **55**, no. 1–3. – P. 61–90.
- [5] *Golberg A.* Homeomorphisms with finite mean dilatations // Contemporary Math. – 2005. – V. **382**. – P. 177–186.
- [6] *Golberg A.* Differential properties of (α, Q) -homeomorphisms, Further Progress in Analysis, World Scientific Publ., 2009, 218–228.
- [7] *Gutlyanskii V.Ya., Ryazanov V.I., Srebro U., Yakubov E.* The Beltrami Equation: A Geometric Approach. – New York etc.: Springer, 2012.
- [8] *Iwaniec T., Martin G.* Geometrical Function Theory and Non-Linear Analysis. – Oxford: Clarendon Press, 2001.
- [9] *Martio O., Ryazanov V., Srebro U. and Yakubov E.* Moduli in Modern Mapping Theory. – New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2009.
- [10] *Martio O., Rickman S., Väisälä J.* Definitions for quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I. Math. – 1969. – V. **448**. – P. 1–40.
- [11] *Martio O., Rickman S., Väisälä J.* Distortion and singularities of quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A1. – 1970. – V. **465**. – P. 1–13.
- [12] *Martio O., Rickman S., Väisälä J.* Topological and metric properties of quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A1. – 1971. – V. **488**. – P. 1–31.
- [13] *Решетняк Ю. Г.* Пространственные отображения с ограниченным искажением. – Новосибирск: Наука, 1982.
- [14] *Rickman S.* Quasiregular mappings. – Berlin etc.: Springer-Verlag, 1993.
- [15] *Vuorinen M.* Conformal Geometry and Quasiregular Mappings, Lecture Notes in Math., 1319. – Berlin etc.: Springer-Verlag, 1988.
- [16] *Ковтонюк Д.А., Рязанов В.И.* Простые концы и классы Орлича–Соболева // Алгебра и анализ. – 2015. – Т. **27**, № 5. – С. 81–116.

- [17] *Gutlyanskii V., Ryazanov V., Yakubov E.* The Beltrami equations and prime ends // Український математичний вісник. – 2015. – **12**, № 1. – С. 27–66.
- [18] *Ковтонюк Д.А., Рязанов В.И., Салимов Р.Р., Севостьянов Е.А.* К теории классов Орлича–Соболева // Алгебра и анализ. – 2013. – **25**, № 6. – С. 50–102.
- [19] *Ковтонюк Д., Салимов Р., Севостьянов Е.* К теории отображений классов Соболева и Орлича–Соболева (под редакцией В.И. Рязанова). – Киев: Наукова думка, 2013.
- [20] *Севостьянов Е.А.* О равностепенной непрерывности гомеоморфизмов с неограниченной характеристикой // Математические труды. – 2012. – **15**, № 1. – С. 178–204.
- [21] *Näkki R.* Prime ends and quasiconformal mappings // J. Anal. Math. – 1979. – V. **35**. – P. 13–40.
- [22] *Vuorinen M.* Exceptional sets and boundary behavior of quasiregular mappings in n -space // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A 1. Math. Dissertationes. – 1976. – **11**. – P. 1–44.
- [23] *Gehring F.W. and Martio O.* Quasiextremal distance domains and extension of quasiconformal mappings // J. d'Anal. Math. – 1985. – **24**. – P. 181–206.
- [24] *Gehring F.W.* Rings and quasiconformal mappings in space // Trans. Amer. Math. Soc. – 1962. – V. **103**. – P. 353–393.
- [25] *Zierner W.P.* Extremal length and conformal capacity // Trans. Amer. Math. Soc. – 1967. – **126**, no. 3. – P. 460–473.
- [26] *Zierner W.P.* Extremal length and p -capacity // Michigan Math. J. – 1969. – **16**. – P. 43–51.
- [27] *Шлык В.А.* О равенстве p -емкости и p -модуля // Сиб. матем. журн. – 1993. – V. **34**, № 6. – С. 216–221.
- [28] *Väisälä J.* Lectures on n -Dimensional Quasiconformal Mappings. Lecture Notes in Math., V. 229. – Berlin etc.: Springer-Verlag, 1971.
- [29] *Кураатовский К.* Топология, Т. 2. – М.: Мир, 1969.
- [30] *Martio O., Srebro U.* Periodic quasimeromorphic mappings // J. Analyse Math. – 1975. – V. **28**. – P. 20–40.
- [31] *Севостьянов Е.А.* Обобщение одной леммы Е.А. Полецкого на классы пространственных отображений // Укр. матем. ж. – 2009. – Т. **61**, № 7. – С. 969–975.
- [32] *Смолова Е.С.* Граничное поведение кольцевых Q -гомеоморфизмов в метрических пространствах // Укр. матем. ж. – 2010. – **62**, № 5. – С. 682–689.
- [33] *Салимов Р.Р.* Об оценке меры образа шара // Сиб. матем. журн. – 2012. – **53**, № 4. – С. 920–930.

- [34] *Ryazanov V.I., Salimov R.R. and Sevost'yanov E.A.* On Convergence Analysis of Space Homeomorphisms // Siberian Advances in Mathematics. – 2013. – V. **23**, no. 4. – P. 263–293.
- [35] *Golberg A. and Salimov R.* Topological mappings of integrally bounded p -moduli // Ann. Univ. Buchar. Math. Ser. – 2012. – **3(LXI)**, no. 1. – P. 49–66.
- [36] *Golberg A., Salimov R. and Sevost'yanov E.* Normal Families of Discrete Open Mappings with Controlled p -Module // Contemporary Mathematics. – 2016. – **667**. – P. 83–103.
- [37] *Cristea M.* The limit mapping of generalized ring homeomorphisms // Complex Variables and Elliptic Equations, 2015, DOI:10.1080/17476933.2015.1107906.
- [38] *Шабат Б.В.* Введение в комплексный анализ, т. 1. – М.: Наука, 1976.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Евгений Александрович Севостьянов

Житомирский государственный университет им. И. Франко

ул. Большая Бердичевская, 40

г. Житомир, Украина, 10 008

тел. +38 066 959 50 34 (моб.), e-mail: esevostyanov2009@mail.ru